

La Lepidotterofauna delle Prealpi Venete sulla base della Collezione A. Ancilotto (1).

Il Conte Alberto Ancilotto (1902-1971), appassionato naturalista, nell'ultimo periodo della sua vita aveva intrapreso e proseguito con grande alacrità una raccolta di Macrolepidotteri italiani che nel corso di una dozzina di anni raggiunse e superò il migliaio di specie. Tale collezione trasse la sua origine dal grande interesse che l'Ancilotto aveva per la cinematografia scientifica, campo nel quale era ben noto per i numerosi documentari sulla vita degli insetti, e per la fotografia. In quest'ultimo settore egli si dedicò in particolare alle larve dei Lepidotteri ed una parte dell'ampia documentazione raccolta fornì il materiale per un libro (Ancilotto, Grollo, Zangheri, 1970).

Parallelamente all'allevamento dei bruchi egli andò riunendo una collezione che, secondo i suoi intendimenti, doveva servire quale base per le riproduzioni fotografiche da pubblicare in un Atlante dei Macrolepidotteri italiani del quale diverse tavole erano già pronte al momento della sua immatura scomparsa.

La collezione Ancilotto è formata da oltre 1100 specie raccolte prevalentemente nelle Venezie. Il materiale proviene per la maggior parte dalle Prealpi Venete comprese tra la Valle del Brenta e i monti ad est del Piave; in particolare è stata minuziosamente esplorata la zona montana a N. di Valdobbiadene (M. Cesen), la pedemontana tra Asolo (Maser) ed il Montello (Crocetta del Montello), il M. Grappa e la bassa valle del Piave (Schievenin, Vas, ecc.). Le specie di questa area sono le sole prese in considerazione nella presente nota.

Nella collezione il rimanente materiale proviene principalmente da altre tre zone vale a dire da Cortina d'Ampezzo e dintorni, dal M. Baldo e da alcune località della costa orientale del Lago di Garda ed infine dal litorale toscano (Castiglione della Pescaia, Ansedonia).

La collezione è stata per la maggior parte determinata o revisionata dal noto specialista di Monaco di Baviera Josef Wolfsberger che ha anche

(1) Questa nota è dedicata alla memoria del Prof. Guido Grandi nel ricordo della sua costante azione di stimolo e di valorizzazione dell'attività degli entomologi dilettanti per il progresso delle conoscenze sulla fauna del nostro Paese.

pubblicato alcune note su reperti particolarmente interessanti (Wolfsberger, 1969, 1970, 1974).

La Collezione mi fu legata dal Conte Ancilotto alla sua morte; è mio intendimento con la presente pubblicazione assolvere non solo ad un debito di riconoscenza verso lo Scomparso ma mettere a disposizione degli studiosi una larga messe di reperti, spesso interessanti, di una delle regioni d'Italia meno note per quanto riguarda i Lepidotteri.

Nella zona delle Prealpi orientali (ad est dell'Adige) la parte meglio conosciuta è quella dei dintorni di Canello (alt. m 500-550) nei Lessini (Wolfsberger, 1961 b) della quale sono note 623 specie di Macrolepidoteri. Per le zone più orientali fino al Tagliamento non esiste alcuna faunula, ma solo poche citazioni occasionali mentre per l'area friulana vi è un lavoro abbastanza ampio di Kusdas e Thurner (1955) riguardante la zona di Gemona e del Lago di Cavazzo che elenca 425 specie di Macro.

Per questo motivo è facile comprendere che il materiale della Collezione Ancilotto presenta un notevole interesse faunistico in quanto permette di avere precisi dati (quasi sempre con la località viene fornita anche l'altitudine) sulla distribuzione dei Lepidotteri in una zona ampia che partendo dalla pianura trevigiana comprende tipiche oasi xerotermiche come sulle colline di Asolo fino ad ambienti tipicamente alpini quali si riscontrano alle alte quote del M. Grappa.

Per facilitare la consultazione del catalogo fornisco qui l'elenco delle località, così come risultano sulle etichette della collezione, con eventuali dati per la loro migliore identificazione sulla allegata carta. Su quest'ultima è rappresentata solamente la zona che è stata più intensamente esplorata e dalla quale proviene la maggioranza delle specie.

Elenco delle località di raccolta.

M. Grappa: da quota 500 fino alla Cima: m 1775 (segnata sui cartellini m 1800).

Asolo, m 207.

Maser, m 142 e colline di Maser, m 300-350 (circa 5 km ad E. di Asolo).

Valdobbiadene, m 253.

Crocetta del Montello, m 151 (spesso abbreviato: Crocetta).

Montello (quasi sempre è specificato che si tratta della: Val Padovana).


Bigolino, m 176 (sul Piave 3 km a S. di Valdobbiadene).

M. Cesen, m 1569: costituisce la zona più esplorata sui vari versanti ed a diverse altitudini. In taluni casi nel cartellino non vi è una più precisa indicazione, ma molto spesso viene indicata la località e l'altitudine come segue: Milies, m 800-1000, sulle pendici occidentali.

Balcon, m 1000, cima a S.W.

Col Vernada, m. 1100 a N.E (Col di Varnada sulla tavoletta I.G.M.).

- Cimon, m. 1200, cima ad E.
Golo (o M. Zogo) m. 1250, cima a N.E.
Endemione (Contr. Endimione sulla tavoletta dell'I.G.M.) pendice degradante del M. Cesen e del M. Cimon verso Valdobbiadene (circa m. 700).
Combai, m 350, a S.E. del gruppo del Cesen.
Marziai, m 270: lungo la riva sinistra del Piave tra Valdobbiadene e Feltre.
Vas, m 200.
Lentiai, m 260, nella conca di Feltre.
Praderadego, m 900, presso Mel (Belluno).
Schievenin, m 357 (5 km a N.W. di Quero).
Cansiglio e Pian del Cansiglio (Vittorio Veneto).
Nevegal (Belluno).
P.so S. Boldo o S. Uboldo, m 696.



Inoltre sono state trascritte anche alcune catture nella adiacente pianura nelle località di: Treviso, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Casacorba e Cavasagra (Vedelago - TV) e Fagaré (S. Biagio di Callalta - TV).

Poichè nell'esame della collezione si sono rilevati reperti sporadici, ma interessanti, provenienti da diverse altre località italiane è stata fatta una scelta delle entità più importanti raccolte nella Laguna Veneta, sui Colli Euganei e sul litorale toscano (Ansedonia, Castiglione della Pescaia). La segnalazione di queste specie, che per il loro limitato numero non meritano una pubblicazione a parte, viene fatta in note a piè di pagina.

* * *

Dall'esame dei reperti elencati emergono molte segnalazioni che estendono più o meno notevolmente verso oriente la distribuzione di numerose specie sul versante meridionale delle Alpi. Ciò si può agevolmente dedurre confrontando il successivo elenco con i dati di Wolfsberger (1965) che per ognuna delle oltre 1100 specie dell'area gardesana fornisce anche la distribuzione sul versante meridionale delle Alpi; tale confronto può essere ulteriormente precisato con i dati della successiva monografia riguardante il M. Baldo (Wolfsberger, 1971).

Inoltre si osserva il fenomeno dell'abbassamento dei limiti altitudinali in diverse entità, caratteristica nota e spesso ancora più accentuata nell'Italia nord-orientale (Friuli). A titolo di esempio si possono segnalare il *Parnassius apollo*, la *Melitaea diamina*, le *Erebia styx* e *stirius* a Marzai, m 270, la *Melicta aurelia* a Crocetta, m 151 e la *Catocala fraxini* sulle colline di Maser ed a Crocetta.

Dall'esame della fauna si rileva anche come « oasi xerothermiche » prealpine siano chiaramente evidenziabili, in base alla lepidotterofauna, anche ad est del Brenta. Fra le località esplorate dall'Ancilotto spicca quella di Maser e delle colline retrostanti, nella quale, fra i numerosi reperti si possono segnalare: *Brenthis hecate*, *Roeselia togatalalis*, *R. albula*, *Polyphaenis sericata*, *Metachrostis dardowini*, *Gnophos variegata*. Ivi si trova anche la mediterranea *Eupithecia gratiosata* che però si eleva fino ai 1250 m di Golo.

Anche sul M. Cesen ed in particolare sulle pendici dell'Endemione si rinvencono specie note per la loro termofilia quali: *Melitaea trivialis*, *Amata marjana*, *Gortyna püngeleri*, *Rhynchodontodes antiqualis*.

Di contro elementi di una fauna tipicamente alpina sono presenti sul massiccio del M. Grappa, il più elevato del tratto di Prealpi qui preso in considerazione ed anche su alcune cime del gruppo del M. Cesen. Tali sono, ad esempio: *Ochropleura musiva*; *Rhyacia helvetina*; *Chersotis ocellina*; *C. cuprea*; *Hadena caesia*; *Phaenocarpa auricoma*; *Cidaria (Entephria) cyanata*; *C. (E.) nobiliaria*; *C. (Coenotephria) verberata*; *C. (Euphyia) luctuata*; *Nyssia alpina*.

Per l'ordinamento delle specie, in mancanza di un catalogo aggiornato dei Lepidotteri, mi sono servito di alcune delle opere più recenti dal punto di vista della sistematica e della nomenclatura e precisamente:

per i Ropaloceri: Higgins e Riley (1971)

per le famiglie dai Nolidi ai Nottuidi compresi: Forster e Wohlfart (1960-71)

per i Geometridi: Schmidlin (1964).

ELENCO DELLE SPECIE.

Fam. PAPILIONIDAE

- 1 - *Papilio machaon* L. - Crocetta del Montello; Endemione. V-VII, IX.
- 2 - *Iphiclides podalirius* L. - Valdobbiadene; Marziai; Crocetta del Montello; Endemione. VII, IX.
- 3 - *Zerynthia polyxena* Den. et Schiff. - Montello (Val Padovana); Lentiai (BL). IV-V.
Entità notoriamente molto localizzata sul versante meridionale delle Alpi. Si tratta delle prime due segnalazioni recenti per la regione Veneta, ove, in particolare sul Montello, si rinviene in colonie abbastanza numerose. Nel Veneto sono noti solo vecchi reperti per la zona gardesana (Wolfsberger, 1965).
- 4 - *Parnassius apollo* L. - M. Grappa: m 1200-1500; Endemione; Marziai (BL). VI-VII.
Da rilevare i reperti a quote molto basse, come quello di Marziai: m 270.
- 5 - *Parnassius mnemosyne* L. - Pian del Cansiglio; Praderadego: m 900 (Mel); M. Grappa: m 1500, VII-VIII.

Fam. PIERIDAE

- 6 - *Aporia crataegi* L. - Crocetta del Montello; Bigolino. V.
- 7 - *Pieris brassicae* L. - Montello; Bigolino; Milies: m 1100. V, VII.
- 8 - *Pieris rapae* L. - M. Cesen; Bigolino; Milies: m 800; Marziai; Crocetta del Montello. VII-IX.
- 9 - *Pieris manni* Mayer (1) - Bigolino. VII.
- 10 - *Pieris napi* L. - Praderadego: m 900; Milies: m 800; Crocetta del Montello; Bigolino; Montello, Val Padovana; Cansiglio; Cesen, Col Vernada: m 1100. IV-X.
- 10 a - *Pieris napi bryoniae* Hb. - Cesen, Col Vernada: m. 1100; Cansiglio. V-VI.
- 11 - *Pontia daplicide* L. - Marziai. VIII.
- 12 - *Anthocharis cardamines* L. - Col Vernada: m 1100; Bigolino; Cansiglio; Montello, Val Padovana. III-VI.
- 13 - *Colias crocea* Fourcr. - Crocetta del Montello; Casacorba. IX-X.
- 14 - *Colias hyale* L. - Bigolino; Casacorba; Colline di Maser; Crocetta del Montello; Montello; Cavasagra, V, VII, IX-X.
- 15 - *Colias australis* Vrtz. - Crocetta del Montello; Colline di Maser; Endemione; Cavasagra; Bigolino. V-IX.

(¹) Raccolta anche, in numerosi esemplari, sui Colli Euganei: Arquà Petrarca, IV-V.

- 16 - *Gonepteryx rhamni* L. - Bigolino; Endemione; Cesen, Cimon: m 1200. VI-VII.
17 - *Leptidea sinapis* L. - Crocetta del Montello. VI, VIII.

Fam. NYMPHALIDAE

- 18 - *Apatura iris* L. - Endemione. VII.
19 - *Apatura ilia* Schiff. - Crocetta del Montello. VIII-IX.
20 - *Limenitis reducta* Stgr. ⁽¹⁾ (= *anonyma* Lewis) - Endemione; M. Grappa; Montello; Crocetta del Montello; Marzai; Schievenin. VI-VIII.
21 - *Limenitis camilla* L. - Alveo del Piave presso Valdobbiadene. VI.
22 - *Neptis rivularis* Sc. - Endemione. VII.
Specie molto localizzata sul versante meridionale delle Alpi che posso segnalare anche del M. Festa (Carnia) e di Togliano (Cividale).
23 - *Polygonia c-album* L. - Marzai; Montello; Crocetta; Endemione; Cesen, V-VII, IX-X.
24 - *Polygonia egea* Cr. - Treviso. VIII.
25 - *Argynnis paphia* L. - Marzai, Nevegal, Lentiai, Valdobbiadene; Endemione; Cesen. VI-VIII.
26 - *Mesoacidalia aglaja* L. - M. Grappa: m. 1600; Crocetta; Cesen. VII.
27 - *Fabriciana niobe* L. - Endemione; Valdobbiadene. VI-VII.
28 - *Issoria lathenia* L. - Endemione; Crocetta. VII-VIII.
29 - *Brenthis hecate* Schiff. - Colline di Maser. VII.
Specie localizzata nota nella regione solo di Nago sul Lago di Garda e di Canello sulle colline veronesi (Wolfsberger, 1965).
30 - *Clossiana selene* Schiff. - Montello, Val Padovana. IV-V.
31 - *Clossiana dia* L. - Marzai; Crocetta; Endemione. VI-VIII.
32 - *Melitaea phoebe* Schiff. - Cansiglio; Colline di Maser; Milies: m 1200; Marzai; Bigolino; Cavasagra. VI-VIII.
33 - *Melitaea didyma* Esp. - Bigolino; Crocetta. VI-IX.
Un esemplare di Bigolino presenta le macchie nere coalescenti su quasi tutta l'ala anteriore.
34 - *Melitaea trivialis* Schiff. - Endemione. V.
È nota la localizzazione di questa specie sul versante meridionale delle Alpi. La presente segnalazione è l'unica località nota tra le colline veronesi e quelle friulane presso Gemona (Wolfsberger, 1965).

⁽¹⁾ Merita segnalazione la *Limenitis populi* L. raccolta a Forno di Canale (BL) m. 970, in diversi esemplari, in quanto la specie è molto localizzata nelle Alpi orientali.

Anche la *Neptis sappho* Poll. (= *aceris* Esp.) catturata a Cividale del Friuli è un interessante reperto. Questa rara specie, localizzata in colonie relitte, era nota nel nostro Paese solo della regione di Gorizia.

- 35 - *Melitaea diamina* Lang. - Marziai. VII.
Cattura degna di nota perchè avvenuta in una delle località più basse note per la catena alpina: m 270.
- 36 - *Melitaea athalia* Rott. - Cansiglio; Milies: m 1200; Cesen; Cavasagra; Marziai; Endemione; Bigolino. VI-VIII.
- 37 - *Mellicta aurelia* Nick. - Crocetta; Cesen. VI-VII, IX.
Degna di nota per la bassa altitudine la cattura a Crocetta del Montello: m 151.
- 38 - *Euphydryas aurinia* Rott. - Cavasagra. V.
Specie localizzata finora mai segnalata nel Veneto.

Fam. SATYRIDAE

- 39 - *Melanargia galathea* L. ⁽¹⁾ - Nevegal; Endemione; M. Grappa: m 1600. VII-VIII.
- 40 - *Hipparchia fagi* Sc. - Marziai; Endemione; Valdobbiadene; Milies: m 800. VI-VIII.
- 41 - *Hipparchia semele* L. - Endemione; Valdobbiadene; Marziai. VII-IX.
- 42 - *Chazara briseis* L. - Valdobbiadene. VIII.
- 43 - *Satyrus ferula* F. - Marziai. VIII.
Come la precedente è nota per la sua localizzazione.
- 44 - *Minois dryas* Sc. - Milies: m 800; Colline di Maser; Endemione; Bigolino; Marziai. VII-VIII.
- 45 - *Erebia aethiops* Esp. - Marziai; Nevegal. VII-VIII.
- 46 - *Erebia medusa* Schiff. - M. Grappa: m 1400-1600. VI-VII.
- 47 - *Erebia alberganus* de Prunn. - Endemione; Milies: m. 1200; S. Uboldo. VI-VIII.
- 48 - *Erebia stirius* Godt. - Endemione; Marziai. VII, IX.
- 49 - *Erebia styx* Frr. - Marziai. VII-VIII.
- 50 - *Maniola jurtina* L. - M. Cesen; Marziai; Endemione; Crocetta; Cavasagra; Bigolino; Milies: m 800. VI-VIII.
- 51 - *Aphantopus hyperantus* L. - Fagarè, Colline di Maser; M. Cesen. VI-VII.
- 52 - *Pyronia tithonus* L. - Bigolino. VIII.
- 53 - *Coenonympha pamphilus* L. - Cansiglio; Crocetta del Montello; M. Cesen: m 600; Maser; Casacorba; Cesen, Col Vernada: m 1100. IV-IX.
- 54 - *Coenonympha arcania* L. - Cavasagra; Casacorba. V.
- 55 - *Coenonympha oedippus* F. - Colline di Maser; Fagarè. VII.
Le presenti catture sono fra le prime della regione veneta donde questa specie, estremamente localizzata, era stata raccolta solo alla sua estremità occidentale a Peschiera (Wolfsberger, 1965).

⁽¹⁾ Merita segnalazione poichè appare molto localizzata nell'Italia centrale la cattura di *Melanargia arge* Sulz. in Umbria a Narni. Per la sua distribuzione in Italia cfr. Zangheri, 1960.

- 56 - *Pararge aegeria* L. - Endemione; Montello. V.
57 - *Lasiommata megera* L. - Endemione; Valdobbiadene; Montello; Crocetta. V, VII.
58 - *Lasiommata maera* L. - Endemione; Marziai. VII-VIII.
59 - *Lasiommata petropolitana* F. - M. Grappa: m 1500. VI.
60 - *Lycopinga achine* Sc. - Fagarè. VII.

I reperti di questa specie e della precedente presentano un certo interesse per la loro nota localizzazione.

Fam. NEMEOBIIDAE

- 61 - *Hamaeris lucina* L. - Montello, Val Padovana; Bigolino; Endemione; M. Cesen: m 600; Maser. IV-VIII.

Fam. LYCAENIDAE

- 62 - *Thecla betulae* L. - Crocetta del Montello; Endemione. VII, VIII.
63 - *Strymonidia spini* Schiff. - M. Grappa; M. Cesen; Endemione. VI-VII.
64 - *Callophrys rubi* L. - Endemione; Cesen, Col Vernada: m 1100. V.
65 - *Lycaena phlaeas* L. ⁽¹⁾ - Casacorba; Montello; Asolo; Crocetta; Maser. V-VI, VIII-X.
66 - *Syntarucus pirithous* L. - Crocetta del Montello. IX.
67 - *Cupido minimus* Fuessl. - Crocetta del Montello, M. Cesen: m 600-1000; Endemione, Col Vernada: m 1100; Praderadego: m 900. IV-V, VIII-IX.
68 - *Celastrina argiolus* L. - Maser; greto del Piave presso Valdobbiadene. VI, VIII.
69 - *Glaucopsyche alexis* Poda - M. Cesen: m 600. IV.
70 - *Maculineaalcon* Schiff. ⁽²⁾ - Endemione. VI.
Si tratta della prima segnalazione di questa rara specie nelle Prealpi Venete.
71 - *Scolitantides orion* Pall. - Crocetta del Montello. V.
72 - *Plebejus argus* L. - Casacorba; Cesen; Endemione; Marziai. VII, VIII, X.
73 - *Lycaeides idas* L. - Bigolino. V.
74 - *Aricia agestis* Schiff. - Cesen. VIII.
75 - *Cyaniris semiargus* Rott. - M. Grappa: m. 1600. VII.
76 - *Plebicula dorylas* Schiff. - Bigolino; Endemione. V-VI.
77 - *Plebicula thersites* Cant. - Endemione. V.

⁽¹⁾ Desidero segnalare, per la sua rarità, una serie di *Lycaena dispar rutila* Wesm. raccolte nella Laguna Veneta in Val Contarina.

⁽²⁾ Ritengo utile segnalare la cattura sui Colli Euganei ad Arquà Petrarca di una specie non frequente: *Philotes baton* Bergst.

- 78 - *Lysandra coridon* Poda - Endemione; Nevegal; Marziai; Cesen; M. Grappa: m 1500. VII-IX.
79 - *Lysandra bellargus* Rott. - Endemione; Asolo; Cesen; Crocetta; M. Grappa: m 1500. V-VII, IX-X.
80 - *Polyommatus icarus* Rott. - Cansiglio; Crocetta; Maser; Cesen, Milies: m 800; Casacorba; Bigolino; Cavasagra; Montello. V-IX.

Fam. HESPERIIDAE

- 81 - *Pyrgus malvae malvoides* Elw. et Edw. - Cesen, Col Vernada: m. 1100. V.
82 - *Pyrgus alveus* Hb. - M. Grappa: m 1300-1600; Crocetta. VII-VIII.
83 - *Carcharodus alceae* Esp. - Crocetta. IX.
84 - *Erynnis tages* L. - Crocetta; Praderadego (Mel): m 900; Montello, Val Padovana; Cesen: m 600; Endemione; Colline di Maser; M. Grappa, Schievenin. IV-V, VIII.
85 - *Heteropterus morpheus* Pall. - Colline di Maser; Fagarè; Marziai. VII. Si tratta di località che sono fra le poche note per le Prealpi Orientali. Io ne ho rinvenuta una colonia anche nel versante orientale del Cansiglio nella Foresta del Prescudin.
86 - *Carterocephalus palaemon* Pall. - Praderadego (Mel): m 900. V. Specie come e più della precedente localizzata sul versante meridionale delle Alpi.
87 - *Hesperia comma* L. - Cesen, Milies: m 800; Crocetta. VIII.
88 - *Ochlodes venatus* Br. et Gr. - Bigolino; Cesen, Milies: m 800. V, VIII.

Fam. NOLIDAE

- 89 - *Roeselia togatulalis* Hbn. - Colline di Maser. VIII.
90 - *Roeselia albula* Schiff. - Crocetta; Colline di Maser; Casacorba. VI, VIII-IX.
91 - *Roeselia strigula* Schiff. - Colline di Maser. VI, VIII.
92 - *Celama confusalis* H. S. - Vas: m 200; Cesen: m 600. V.
93 - *Celama centonalis* Hbn. - Crocetta. VIII-IX.

Fam. LYMANTRIIDAE

- 94 - *Dasychira pudibunda* L. - Endemione; Montello; Cesen. IV-V.
95 - *Orgyia gonostigma* F. - Crocetta. VI.
96 - *Orgyia recens* Hbn. - Crocetta; M. Grappa: m 1700. VII-X.
97 - *Arctornis L-nigrum* Muell. - Miuzzi, Crocetta; Endemione: m 700; Schievenin. VII, IX.
98 - *Leucoma salicis* L. - Cesen, Cimon: m 1200. VII.

- 99 - *Lymantria dispar* L. - Crocetta. VIII-IX.
100 - *Lymantria monacha* L. - Nevegal. VII.
101 - *Porthesia similis* Fuessl. - Crocetta; Montello, Val Padovana. V-VI, VIII-IX.

Fam. ARCTIIDAE

- 102 - *Cybosia mesomella* L. - M. Grappa: m. 1300. VI.
103 - *Miltochrista miniata* Forst. - Colline di Maser; Crocetta; Schievenin, M. Cesen. VI-IX.
104 - *Lithosia quadra* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Crocetta; Casacorba. VI-VII, IX-X.
105 - *Eilema depressa* Esp. - Endemione; Crocetta. VI, IX.
106 - *Eilema pygmaeola pallifrons* Z. - Cesen: m 600. IX.
107 - *Eilema complana* L. - Crocetta; Cesen: m 750. VI, VIII-IX, XI.
108 - *Eilema lurideola* Zinck. - Crocetta; Schievenin. V-VII, IX.
109 - *Eilema caniola* Hb. - Crocetta. V-VI, IX.
110 - *Eilema griseola* Hb. - Crocetta. VI, VIII-IX.
111 - *Systropha sororcula* Hb. - Crocetta; Vas: m 200; Colline di Maser. V-VI.
112 - *Atolmis rubricollis* L. - Cesen, Golo: m 1250; Endemione; Schievenin. VI-VII.
113 - *Coscinia striata* L. - Ponzano di Treviso. V.
114 - *Coscinia cribraria punctigera* Fer. f. *candida* Cyr. - Maserada sul Piave. IV.
115 - *Phragmatobia fuliginosa* L. - Crocetta. VII-IX.
116 - *Parasemia plantaginis* L. - Nevegal: m 1500; M. Grappa: m 300-1600. VI-VII.
Sul M. Grappa sono presenti, col tipo, esemplari della f. *hospita* Schiff. e della f. *matronalis* Frr.
117 - *Spilarctia lubricipeda* L. - Crocetta. V-VIII.
118 - *Spilosoma menthastri* Esp. - Crocetta. V-VII.
119 - *Arctinia caesarea* Goeze - Endemione e M. Cesen. V-VI.
Segnalata dal Mariani (1941-43) solo per la Venezia Tridentina e da Wolfsberger (1971) delle regioni settentrionali centro-orientali d'Italia. Posso segnalare anche un primo reperto appenninico avendola rinvenuta in Toscana a Pratovecchio il 28-VI-1965.
120 - *Cyenia mendica* Cl. - M. Cesen; M. Grappa: m 500; Endemione.
121 - *Diacrisia sannio* L. - M. Grappa: m 1300; Crocetta. V-VI, VIII.
122 - *Hyphoraia aulica meridialpina* Dann. - Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 1300-1600. VI.
123 - *Arctia caja* L. - Colline di Maser; Crocetta. VI-IX.
124 - *Arctia villica* L. - Crocetta; Endemione; Montello, Val Padovana; Miuzzi. V-VI.

- 125 - *Panaxia dominula* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Schievenin; Asiago; M. Grappa. VI-VIII.
126 - *Panaxia quadripunctaria* Poda - Miuzzi; Colline di Maser; Crocetta; Endemione. VIII-IX.
127 - *Thyria jacobaea* L. - Crocetta. V.
128 - *Amata phegea* L. - M. Grappa: m 1600; M. Cesen; Montello. VI-VII.
129 - *Amata marjana* Stdr. - M. Cesen. V.
Specie molto localizzata nelle Prealpi. Wolfsberger (1971) elenca le stazioni note in Italia fra le quali, nella regione veneta, vi è solo Bassano del Grappa.

Fam. ENDROSIDAE

- 130 - *Pelosia muscerda* Hfn. - Crocetta. VI, VIII.

Fam. THAUMETOPOEIDAE

- 131 - *Thaumetopoea processionea* L. - Maser. VII.
Catture da rilevare in quanto la « Processionaria della quercia » appare, almeno dalle osservazioni di questi ultimi decenni, divenuta sempre più rara e localizzata. Nell'ambito della regione la possiede anche di Raldon nel basso Veronese.
132 - *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Endemione: m 1000; Crocetta; Maser. VII-VIII.

Fam. NOTODONTIDAE

- 133 - *Harpypia furcula* Cl. - Crocetta; Schievenin; M. Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1100. IV-VIII.
134 - *Harpypia hermelina* Goeze - Crocetta; Asolo; Schievenin. IV-VIII.
135 - *Cerura herminea* Esp. - Crocetta. VI-VIII.
136 - *Cerura vinula* L. - Crocetta; Schievenin. V-VIII.
137 - *Stauropus fagi* L. - Nervesa; Cesen; Endemione; Crocetta; Montello, Val Padovana. IV-VII.
138 - *Exaereta ulmi* Schiff. - Treviso. IV.
La specie è stata raccolta anche sui Colli Euganei al M. Madonna e ad Arquà Petrarca.
139 - *Hybocampa milhauseri* F. - Asolo; Colline di Maser; Milies: m 1000. IV-VI.
140 - *Gluphisia crenata* Esp. - Crocetta; Endemione: m 800; Maser: m 350, Cesen: m 600; Col Vernada: m 1100, IV-VII.
141 - *Drymonia trimacula* Esp. - Col Vernada: m 1100; Maser: m 350; Cesen: m 600; Endemione: m 800; Montello, Val Padovana. V-VI.

- 142 - *Drymonia ruficornis* Hufn. - Colline di Maser; Cesen: m 600; Endemione. IV-V.
- 143 - *Peridea anceps* Goeze - Cesen: m 600; Endemione; Maser: m 350. IV-V.
- 144 - *Pheosia tremula* Cl. - Crocetta; Endemione. IV-IX.
- 145 - *Pheosia gnoma* F. - M. Grappa: m 700; Endemione: m 600-800; Milies: m 1000-1200; Col Vernada: m 1100. V-X.
- 146 - *Notodonta phoebe* Sieb. - Endemione: m 800; Crocetta; Asolo; Cesen, Cimon: m 1200. IV-V, VII-VIII.
- 147 - *Notodonta terva* Hbn. - Endemione. V.
- 148 - *Notodonta dromedarius* L. - Crocetta; Endemione; IV-V, VIII-IX.
- 149 - *Notodonta ziczac* L. - Col Vernada: m 1100; Crocetta. IV-V.
- 150 - *Spatalia argentina* Schiff. - Colline di Maser; Miuzzi; Schievenin; Endemione: m 700. V-VII.
Specie reperita anche sui Colli Euganei al M. Madonna.
- 151 - *Ochrostigma velitaris* Hufn. - Colline di Maser; M. Grappa. V-VIII.
- 152 - *Lophopteryx camelina* L. - Marziai; Crocetta. V-VI, VIII-IX.
- 153 - *Lophopteryx cuculla* Esp. - Cesen, Cimon: m 1200; Col Vernada: m 1200; Crocetta; Endemione: m 1000; Marziai. IV-V, VII-IX.
- 154 - *Pterostoma palpina* L. - Crocetta. IV-V, VIII.
- 155 - *Ptilophora plumigera cartolarii* Wolfsb. ⁽¹⁾ - Endemione: m 300-600; Cesen: m 350-800. XI-XII.
- 156 - *Phalera bucephala* L. ⁽²⁾ - Crocetta. V-VI, IX.
- 157 - *Clostera curtula* L. - Endemione; Asolo; Crocetta; Montello, Val Padovana; Cesen: m 600. IV-V, VIII.
- 158 - *Clostera anastomosis* L. - Crocetta; Casacorba; Colline di Maser, VII, IX-XI.
- 159 - *Clostera pigra* Hufn. - Crocetta; M. Grappa: m 1600; Colline di Maser. V-VI, VIII-IX.

Fam. ZYGAENIDAE

- 160 - *Jordanita chloros* Hbn. - Cesen. VI.
Specie della quale sono noti in Italia, sec. Mariani, 1941-43, reperti solo per la Lombardia, la Venezia Tridentina e l'Abruzzo, Si tratta di entità localizzata in luoghi secchi e mai abbondante.
- 161 - *Roccia budensis* Speyer - Crocetta. V.
Citata dal Mariani (1941-43) solo per la Romagna, l'Abruzzo e l'Italia Centrale in genere.

⁽¹⁾ La ssp. è stata descritta da Wolfsberger (1961 a) delle Prealpi veronesi.

⁽²⁾ Ritengo interessante la cattura di *Phalera bucephaloides* O. in Toscana: Ansedonia, 12-30/8/1970. La distribuzione di questa rara specie è stata riassunta da Wolfsberger, 1965 che cita le località alpine e prealpine a lui note. Si tratta del primo reperto nell'Italia peninsulare.

- 162 - *Mesembrynus purpuralis* Brunn (1). - Crocetta; Cesen; Milies; m 800-1100; M. Grappa: m 1300-1600. V-VII.
163 - *Thermophila meliloti* Esp. - Crocetta. V.
164 - *Agrumenia carniolica* Scop. - Endemione. VI-VII.
165 - *Zygaena filipendulae* L. - Crocetta; Endemione; Cesen; M. Grappa: m 1600. V-VII.
166 - *Polymorpha transalpina* Esp. - Cesen; Endemione. VI-VII.

Fam. COCHLIDIIDAE

- 167 - *Apoda limacodes* Hufn. - Endemione; M. Grappa; Schievenin; Cesen. VI-VII.

Fam. SPHINGIDAE

- 168 - *Mimas tiliae* L. - Crocetta; Combai. IV-VIII.
169 - *Laothoë populi* L. - Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000; Casacorba. V-VIII.
170 - *Smerinthus ocellata* L. - M. Grappa: m 1300; Crocetta. V-VIII.
171 - *Sphinx ligustri* L. - Cesen; Crocetta; Nevegal. V-VII.
172 - *Hyloicus pinastri* L. (2) - Cesen; Crocetta. V-VI.
173 - *Celerio euphorbiae* L. - Cesen: m 900-1000; Crocetta; Endemione: m 800. V-VII.
174 - *Celerio vespertilio* Esp. - M. Grappa: m 650; Schievenin; Miuzzi; Endemione: m 600. V-VIII.
175 - *Celerio lineata* F. - Crocetta. VI.
176 - *Deilephila elpenor* L. - Crocetta; Schievenin. V, VII-VIII.
177 - *Deilephila porcellus* L. - M. Grappa: m 1000; M. Cesen: m 600; Endemione; Schievenin; Crocetta. IV-V, VII.
178 - *Proserpinus proserpina* Pall. - Miuzzi. V.
Specie localizzata e scarsa, segnalata in qualche località dell'area Gardesana (Wolfsberger, 1965).
179 - *Macroglossus stellatarum* L. - Crocetta. VI, IX, XI.

(1) La *Peucedanophila cynarae* Esp. viene citata di Asolo da Wolfsberger, 1974. Nella collez. Ancilotto vi sono diversi esemplari della specie privi di cartellino che, con ogni probabilità, provengono dalla medesima zona.

(2) Merita segnalazione il rinvenimento a Vicenza di una larva di *Daphnis nerii* L. da cui è sfarfallato l'adulto il 23-VIII-69. Catture di questa specie sono molto saltuarie nell'Italia settentrionale e, per quanto riguarda il Veneto, sono note per la zona Gardesana e per Canello sui Lessini (Wolfsberger, 1961 b e 1965).

- 180 - *Haemaris tityus* L. - Endemione; M. Grappa: m 1400; Col Vernada: m 1100. V, VII.

Specie di cui si conoscono poche segnalazioni per l'Italia settentrionale: Pai sul Garda (Wolfsberger, 1965); Canello presso Verona (Wolfsberger, 1961 b); M. Baldo (Wolfsberger, 1971); M. S. Simeone presso Gemona e M. Canin in Friuli (Kusdas e Thurner, 1955).

Fam. THYATIRIDAE

- 181 - *Habrosyne pyritoides* Hufn. (= *derasa* L.) - Crocetta; Montello, Val Padovana; Endemione; M. Cesen: m 950; Colline di Maser. V, VIII-IX.
182 - *Thyatira batis* L. - Crocetta; Colline di Maser; M. Cesen: m 600-900; Endemione; Vas: m 200. V-IX.
183 - *Tethea duplaris* L. - Schievenin; M. Cesen; Golo: m. 1250; Milies: m 1200. VI-VII.
184 - *Tethea* or Schiff. - Crocetta; Maser; Endemione: m 800; Schievenin; Cesen; Balcon: m 1000; Cimon: m 1200; Asolo. IV-VIII.
185 - *Tethea ocularis* L. - Crocetta; Colline di Maser. V-IX.
186 - *Polyptoca flavicornis* L. - Cesen: m 650. III.

Specie localizzata e segnalata per la prima volta nella regione veneta. L'esemplare appartiene alla ssp. *meridionalis* Wolfsb.

Fam. DREPANIDAE

- 187 - *Drepana falcataria* L. - Endemione; Crocetta. V, VII-VIII.
188 - *Drepana harpagula* Esp. - Schievenin; Maser: m 350; Endemione; Cesen: m 600. V, VIII.
189 - *Drepana binaria* Hufn. - Maser; Schievenin; Endemione. VI-IX.
190 - *Drepana cultraria* F. - Cesen; Milies: m 1000. IX.
191 - *Cilix glaucata* Scop. - Cesen: m 600; Crocetta. IV, VIII-IX.

Fam. SYSSPHINGIDAE

- 192 - *Aglia tau* L. - Cesen, Col Vernada: m 1100; Cansiglio. V-VI.

Fam. LEMONIIDAE

- 193 - *Lemonia taraxaci* Esp. - Crocetta. IX-X.

Fam. LASIOCAMPIDAE

- 194 - *Malacosoma neustria* L. ⁽¹⁾ - Cesen, Col Vernada: m 1000-1100. VI-VII.

⁽¹⁾ Merita segnalazione il reperimento di numerosi esemplari di *Malacosoma castrensis veneta* Stdf. nella Laguna di Venezia in VI-VII.

- 195 - *Poecilocampa populi* L. - Endemione: m 600; M. Grappa: m 600; Cesen. XI-XII.
196 - *Lasiocampa quercus* L. - Crocetta; Schievenin; Cesen; Endemione. VI-VIII.
197 - *Pachygastria trifolii* Schiff. - Crocetta. VIII-IX.
198 - *Macrothylatia rubi* L. - Miuzzi; Crocetta; Schievenin. V-VI.
199 - *Epicnaptera tremulifolia* Hbn. - Endemione: m 800; Cesen: m 900; Miuzzi; Schievenin; Cesen, Col Vernada: m 1100; Maser: m 350. V.
200. - *Gastropacha quercifolia* L. - Crocetta; M. Grappa: m 700. VII-IX.
201 - *Gastropacha populifolia* Esp. - Costacorba; Crocetta. V-VI.
Specie rara e localizzata nell'Italia settentrionale segnalata per il Veneto solo di recente da Wolfsberger, 1974 della riva meridionale del Garda.
202 - *Odonestis pruni* L. - Crocetta; Schievenin; Cansiglio. VI, VIII-IX.
203 - *Dendrolimus pini* L. - M. Grappa: m 700. VIII.

Fam. PSYCHIDAE

- 204 - *Pachythelia villosella* O. - Crocetta. VIII.
205 - *Canephora unicolor* Hufn. - Endemione. VI.
206 - *Psyche viciella* Schiff. - Costacorba. VI.
Questa specie, segnalata per l'Italia settentrionale solo dell'area Gardesana (Wolfsberger, 1965) è stata rinvenuta anche sui Colli Euganei al M. Madonna e nella Laguna Veneta.
207 - *Cochliotheca crenulella* Brd. - Crocetta. VIII.
208 - *Rebelia thomanni* Rbl. - Schievenin. V.
Questa specie raccolta numerosa anche sui Colli Euganei ad Arquà Petrarca ed al M. Madonna risulta segnalata da Wolfsberger, 1971 del M. Baldo. Detto A. fornisce come distribuzione di questo Psichide nel nostro Paese: Alto Adige, Trentino, Regione del Garda, Venezia, Lombardia.
209 - *Psychidea bombycella* Schiff. - Costacorba; Maser: m 350; Crocetta. V-VI.

Fam. AEGERIIDAE

- 210 - *Aegeria apiformis* Cl. - Crocetta; Ponzano (TV). VI.

Fam. COSSIDAE

- 211 - *Cossus cossus* L. ⁽¹⁾ - Crocetta; Costacorba. VI-VII.
212 - *Zeuzera pyrina* L. - Crocetta; Schievenin. VI-VII.

⁽¹⁾ Merita segnalazione la cattura di diversi esemplari di *Hypopta caestrum* Hb. nella Laguna veneta (28-VII-69 - 1-VII-70). Risulta questa la località più settentrionale finora nota in Italia.

Pure di un qualche interesse è la presenza della *Dysspessa ulula* Bkh. sui Colli Euganei (Arquà Petrarca). È specie localizzata nell'Italia settentrionale negli ambienti più caldi.

Fam. HEPIALIDAE

- 213 - *Hepialus fusconebulosa* De Geer - Crocetta; Cesen, Milies: m 1000. VIII-IX.

Fam. NOCTUIDAE

- 214 - *Euxoa obelisca* Hb. (1) - M. Grappa: m 650. IX.
215 - *Euxoa cos* Hbn. - Endemione. IX.
216 - *Euxoa decora* Hb. - M. Grappa: m 700. VIII.
217 - *Euxoa birivia* Hb. - Crocetta; Cesen, Golo: m 1250. VI-VII.
218 - *Euxoa recussa* Hb. - Cesen; Milies: m 1000. IX.
219 - *Scotia cinerea* Schiff. - Cesen; Endemione: m 600-1000. V-VI.
220 - *Scotia segetum* Schiff. - Cesen: m 750; Balcon: m 1000; Crocetta; Maser: m 350; Endemione: m 700. V, VII-VIII, X-XI.
221 - *Scotia clavis* Hufn. - M. Grappa: m 1700; Cesen, Golo: m 1250. VII.
222 - *Scotia exclamationis* L. - Crocetta; Montello, Val Padovana; Cesen; Maser: m 350. V-VIII.
223 - *Scotia ipsilon* Hufn. - Crocetta; Maser; Endemione: m 700. IX-X.
224 - *Ogygia nigrescens* Höfn. - Cesen; Schievenin. VII.
225 - *Ochropleura praecox* L. - Cesen, Balcon: m 1000, Golo: m 1250; Crocetta. VII, IX.
226 - *Ochropleura musiva* Hbn. - Cesen. Golo: m 1250. VII.
227 - *Ochropleura plecta* L. - Crocetta; Asolo; Endemione. IV-X.
228 - *Rhyacia lucipeta* Schiff. - Cesen: m 1000; Colline di Maser. IX-X.
229 - *Rhyacia simulans* Hufn. - Crocetta; Endemione. V-VI, IX-X.
230 - *Rhyacia helvetina* B. - M. Grappa: m 1500. VII.
231 - *Chersotis ocellina* Schiff. - M. Grappa: m 1680. VII.
232 - *Chersotis multangula* Schiff. - Cesen, Golo: m 1250. VII.
233 - *Chersotis margaritacea* Vill. - Cesen: m 600-750; M. Grappa: m 650; Colline di Maser. IX-X.
234 - *Chersotis cuprea* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000. VIII.
235 - *Noctua pronuba* L. - Crocetta; Endemione: m 600. V-VI, X.
236 - *Noctua comes* Hb. - M. Grappa: m 1800; Endemione; Maser; Schievenin; Cesen, Milies: m 1000. VI-IX.
237 - *Noctua fimbriata* Schreber- Maser; Crocetta; Endemione: m 1200. VI-VII.
238 - *Noctua janthina* Schiff. - Crocetta; Schievenin; Endemione; M. Grappa: m 1680. VII-IX.

(1) Merita segnalazione la cattura della termofila *Euxoa temera* Hbn. sui Colli Euganei al M. Madonna.

- 239 - *Spaelotis ravida* Schiff. - M. Grappa: m 1000; Cesen: m 600. VII, IX.
240 - *Eugraphe sigma* Schiff. - Schievenin. VI-VII.
241 - *Lycophotia porphyrea* Schiff. - M. Grappa: m 1680; Colline di Maser; Endemione: m 700. VII.
242 - *Peridroma saucia* Hbn. - Endemione: m 600-700; Crocetta; Cesen: m 350-750; Colline di Maser. VII, IX-XI.
243 - *Diarsia mendica* F. - Cesen, Golo: m 1250; Cesen, Cimon: m 1200; M. Grappa: m 1680. VII.
244 - *Diarsia brunnea* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Cesen, Cimon: m 1200; Schievenin; Endemione: m 1000. VII.
245 - *Amathes c-nigrum* L. - Crocetta; Endemione; Cesen, Balcon: m. 1000. V, VII, XI.
246 - *Amathes ditrapezium* Schiff. - Schievenin; Crocetta; Cesen; Colline di Maser. VI-VII.
247 - *Amathes triangulum* Hufn. - Schievenin; Endemione: m 1000; Cesen, Balcon: m 1000; Cesen, Cimon: m 1200; Cesen, Milies: m 800; Cesen, Golo: m 1250; M. Grappa: m 1600. VI-VIII.
248 - *Amathes ashwortii* Dbl. ssp. *candelarum* Stgr. - M. Grappa: m 1700; Cesen, Golo: m 1250. VII.
249 - *Amathes baja* Schiff. - Cesen, Milies: m 1000; id.; Cimon: m 1200; id.; Golo: m 1250. VII, IX.
250 - *Amathes rhomboidea* Esp. - Cesen: m 700; id.; Milies: m 1000; id.; Balcon: m 1000. VIII-IX.
251 - *Amathes castanea* Esp. - Cesen: m 700-750; Schievenin; Maser: m 300. IX-X.
252 - *Amathes xanthographa* Schiff. - Crocetta; Colline di Maser; Cesen, Milies: m 700; Schievenin. VIII-X.
253 - *Anaplectoides prasina* Schiff. - Cesen, Milies: m 1200; id.; Golo: m 1250. VI-VII.
254 - *Cerastis rubricosa* Schiff. - Endemione; Cesen: m 600. III-V.
255 - *Mesogona oxalina* Hb. ⁽¹⁾ - Miuzzi; Crocetta. IX-X.
256 - *Discestra trifolii* Hufn. - Crocetta; Maser. VI-VII.
257 - *Discestra marmorosa* Bkh. ⁽²⁾ - M. Grappa: m 1300-1700. VII.
258 - *Polia bombycina* Hufn. - M. Grappa: m 1500-1600. VII.
259 - *Polia nebulosa* Hufn. - M. Grappa; Cesen, Balcon: m 1000, Milies: m 1100; Cimon: m 1200; Golo: m 1250; Schievenin; Endemione. VI-VII.

⁽¹⁾ *Mesogona acetosellae* Schiff. è stata catturata sul M. Madonna (colli Euganei) il 5-X-67. È specie tipicamente termofila.

Nella stessa località è stata catturata in più esemplari anche l'*Anarta myrtilli* L.

⁽²⁾ La *Discestra sodae* Rbr. è stata catturata in buon numero nella parte meridionale della Laguna veneta. Si tratta del primo reperto sull'Adriatico di questa specie tipicamente alofila. Nella stessa Laguna si trova la congenera *D. stigmosa* Christ. ssp. *atlantica* Bours. (cfr. Zangheri, 1958 a).

- 260 - *Pachetra sagittifera* Hufn. - M. Grappa: m 1500-1800; Cesen, Milies: m 1200. V-VII.
- 261 - *Sideritis evidens* Hb. - Schievenin; Endemione; M. Grappa: m 700. V, VII-VIII.
- 262 - *Sideritis albicolon* Sepp - Crocetta. V.
Questa specie, nota in Italia solo per il Piemonte, il Trentino-Alto Adige e la zona del Garda è presente anche sui Colli Euganei (Arquà Petrarca) in maggio.
- 263 - *Heliophobus reticulata* Goeze - Schievenin; Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1250; Endemione: m 1000; M. Grappa: m 1600. VI-VII.
- 264 - *Mamestra brassicae* L. - Crocetta; Cesen, Col Vernada; Endemione. IV-V, VII-VIII.
- 265 - *Mamestra persicariae* L. ⁽¹⁾ - Schievenin; Cesen, Balcon: m 1000; Crocetta; Colline di Maser. V-VII.
- 266 - *Mamestra contigua* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1250; Cimon: m 1200; Schievenin. VII.
- 267 - *Mamestra w-latinum* Hufn. - Endemione: m 600; M. Grappa: m 500; Schievenin; Maser. VI-VII.
- 268 - *Mamestra thalassina* Hufn. - Cesen, Milies: m 1200. VI.
- 269 - *Mamestra suasa* Schiff. - Crocetta; Asolo; Montello, Val Padovana; Endemione; Schievenin. IV-VIII.
- 270 - *Mamestra oleracea* L. - Crocetta; Asolo; Cesen: m 600; Endemione: m 1000. IV-IX.
- 271 - *Mamestra aliena* Hbn. - Schievenin. VII.
- 272 - *Mamestra pisi* L. - M. Grappa: m 1600-1800; Cesen, Milies: m 1100. V-VII.
- 273 - *Mamestra bicolorata* Hufn. - Schievenin; Crocetta; Asolo; Endemione; Colline di Maser; Cesen. IV-VII.
- 274 - *Mamestra dysodea* Schiff. - Crocetta. VI-VII.
- 275 - *Hadena rivularis* F. - Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000; Endemione. IV, VII-IX.
- 276 - *Hadena lepida* Esp. - Crocetta; Endemione: m 700; Schievenin; Cesen, Balcon: m 1000; Col Vernada: m 1000; Marzai; Colline di Maser. V-VIII.
- 277 - *Hadena luteago* Schiff. - Crocetta; Maser; Schievenin; Endemione; Cesen, Balcon: m 1000; Cimon: m 1200. VII.
- 278 - *Hadena filigrana* Esp. - Endemione: m 600; Cesen, Balcon: m 1000. V-VII.
- 279 - *Hadena albimacula* Bkh. - M. Grappa: m 1700; Endemione; Cesen, Balcon: m 1000. V-VII.

⁽¹⁾ Merita segnalare la cattura di numerose *M. peregrina* Tr. nella Laguna. È specie alofila segnalata dal Mariani (1941-43) solo per la Sardegna.

- 280 - *Hadena confusa* Hufn. - M. Grappa: m 1400-1600; Cesen. VII.
281 - *Hadena caesia* Schiff. - M. Grappa: m 1300-1600, Milies: m 1000. VI-VII.
282 - *Hadena bicurris* Hufn. - Cesen: m 750; Miuzzi. IX.
283 - *Lasionycta nana* Hufn. - M. Grappa: m 1300-1700; Schievenin; Endemione; Cesen, Milies: m 1100. VI-VII.
284 - *Eriopygodes imbecilla* F. - Cesen, Milies: m 1100-1200, Cimon: m 1200. VI-VII.
Specie rara e localizzata segnalata dal Mariani, 1941-43 solo per le Alpi Marittime e la Venezia Tridentina.
285 - *Cerapteryx graminis* L. - Crocetta; M. Grappa: m 1700; Cesen, Balcon: m 1000. VII-VIII.
La specie è talvolta infestante come già da me segnalato sul M. Cesen (cfr. Zangheri, 1958 b).
286 - *Tholera decimalis* Poda - Crocetta; Cesen, Milies: m 1000. IX.
287 - *Panolis flammea* Schiff. - Spiazzi; Colline di Maser. IV-V.
Specie non ancora segnalata per le regioni orientali italiane.
288 - *Xylomyges conspicillaris* L. ⁽¹⁾ - Endemione: Cesen: m 600-900; Col Vernada: m 1100. IV-V.
289 - *Orthosia cruda* Schiff. - Colline di Maser. III-IV.
290 - *Orthosia miniosa* Schiff. - Spiazzi. IV.
291 - *Orthosia stabilis* Schiff. - Endemione; Cesen: m 600-650; Colline di Maser. III-IV.
292 - *Orthosia incerta* Hufn. - Cesen: m 650; Endemione; Crocetta. III-IV.
293 - *Orthosia munda* Schiff. - Cesen: m 600-650. Colline di Maser; Endemione, III-IV.
294 - *Orthosia gothica* L. - M. Grappa; Endemione; Cesen: m 650. III-IV.
295 - *Mythimna turca* L. - Crocetta; Montello, Val Padovana. V, VII-VIII.
296 - *Mythimna conigera* Schiff. - M. Grappa: m 1700-1800; Endemione: m 1000; Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1200. VI-VII.
297 - *Mythimna ferrago* F. - Endemione: m 700-1000; Maser; Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1000; Schievenin; M. Grappa: m 700-1200. VII-IX.
298 - *Mythimna albipuncta* Schiff. - Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000; Maser; Endemione; Schievenin. III-V, VII-X.
299 - *Mythimna vitellina* Hb. - M. Grappa; Crocetta; Cesen, Col Vernada: m 1100; Endemione; V-VI; VIII-IX.
300 - *Mythimna unipuncta* Haw. - Cesen. XI.
Esemplare, con ogni probabilità, migrante. Sono molto scarse le catture di questa specie sul versante meridionale delle Alpi.
301 - *Mythimna pallens* L. - Crocetta. V, VII-X.

⁽¹⁾ Sono degne di segnalazione due specie raccolte sul litorale tirrenico della Toscana ad Ansedonia: si tratta di *Britys pancratii* Cyr. e *B. encaustus* Hb. ambedue segnalati dal Mariani solo della Liguria e della Sicilia. Per la prima cfr. Ciampolini, 1956.

- 302 - *Mythimna l-album* L. - Crocetta; Marzai; Schievenin. V, VIII-X.
303 - *Mythimna sicula scirpi* Dup. ⁽¹⁾ - Endemione; Cesen: m 800; Asolo; Crocetta; Maser: m 350. V-VI.
304 - *Leucania comma* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1200; M. Grappa: m 700-1700; Endemione: m 1000. VI-VIII.
305 - *Acantholeucania loreyi* Dup. - Cesen: m 750. IX.
306 - *Amphipyra pyramidea* L. - Crocetta; Schievenin; Cesen, Balcon: m 1000. VII-IX.
307 - *Amphipyra tragopoginis* Cl. - Maser; M. Grappa: m 1700; Crocetta; Endemione; Cesen: m 750. VI-VIII.
308 - *Mormo maura* L. - Crocetta. VI-IX.
309 - *Dypterygia scabriuscula* L. - Endemione; Crocetta. V-IX.
310 - *Rusina ferruginea* Esp. - Cesen, Milies: m 800-1200; Cimon: m 1200; Maser. VI-VII.
311 - *Polyphaenis sericata* Esp. - Schievenin; Maser. VII.
Specie termofila di cui si conoscono poche località di cattura nell'Italia settentrionale.
312 - *Talpophila matura* Hufn. - Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000. VII-IX.
313 - *Euplexia lucipara* L. - Crocetta; Cesen: m 600; Endemione; V, VII-VIII.
314 - *Phlogophora meticulosa* L. - Crocetta; Endemione; Cesen, Milies: m 700; Cimon: m 1000. V, VII, IX-X.
315 - *Callopietria juvenina* Cr. - M. Grappa: m 1700; Crocetta; Schievenin; Cesen; Colline di Maser. VII-VIII.
316 - *Callopietria latreillei* Dup. - Schievenin; Crocetta; Maser: m 300; Cesen: m 700. VIII-IX.
317 - *Telesilla amethystina* Hb. - Crocetta: Endemione; Schievenin; Cesen. V-VIII.
318 - *Callogonia virgo* Tr. - Crocetta. VI, VIII-IX.
319 - *Ipimorpha subtusa* Schiff. - Schievenin; Crocetta; Cesen, Milies; m 1100. VII-VIII.
320 - *Enargia ipsilon* Schiff. - Crocetta; Casacorba; Schievenin. VI.
321 - *Cosmia affinis* L. - Colline di Maser; Schievenin; Endemione. VII.
322 - *Cosmia trapezina* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1250; Endemione Miuzzi; Crocetta; Schievenin; Maser. VI-IX.
323 - *Auchmis comma* Schiff. - M. Grappa: m 700; Miuzzi. VIII-IX.
324 - *Actinotia polyodon* Cl. - Cesen, Col Vernada: m 1100. V.
Specie segnalata raramente sul versante meridionale delle Alpi in Piemonte, Alto Adige e zona del Garda. La possesso anche di Istrana, nella pianura Trevigiana.

⁽¹⁾ Merita di essere segnalata la cattura della *M. zae* Dup. nella Laguna Veneta. Si tratta di specie alofila mediterranea non ancora segnalate nel nostro Paese.

- 325 - *Actinotia hyperici* Schiff. - M. Grappa: m 700; Endemione. VII-VIII.
- 326 - *Apamea monoglypha* Hufn. - Crocetta; M. Grappa; Endemione: m 600-1000; Schievenin; Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1200. VI-VIII.
- 327 - *Apamea lithoxylea* Schiff. - Endemione; Schievenin; Cesen, Milies: m 1100; Golo: m 1250. VI-VII.
- 328 - *Apamea sublustris* Esp. - M. Grappa: m 600-1600; Cesen, Milies: m 1100. VI-VII.
- 329 - *Apamea crenata* Hufn. - M. Grappa: m 1300-1600; Endemione: m 600-1000; Cesen, Col Vernada: m 1100; Golo: m 1250; Milies: m 1100; Balcon: m 1000. V-VII.
- 330 - *Apamea aquila* Donz. - Cesen, Golo: m 1250; Cimon: m 1200; Endemione: m 1000; Schievenin; M. Grappa: m 1600. VIII.
- 331 - *Apamea furva* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 1300-1700.
- 332 - *Apamea illyria* Frr. - Cesen, Col Vernada: m 1100; Golo: m 1250; Endemione; M. Grappa: m 1300. V-VII.
- 333 - *Apamea anceps* Schiff. - Crocetta; Endemione. V.
- 334 - *Apamea sordens* Hufn. - Cesen, Milies: m 1200; M. Grappa: m 1600. VI-VII.
- 335 - *Apamea scolopacina* Esp. - Crocetta; Maser; M. Grappa: m 1400; Cesen. VII.
- 336 - *Apamea ophiogramma* Esp. - M. Grappa: m 1300. VI.
Specie nota in Italia solamente dell'Alto Adige, della zona del Garda e del M. Baldo.
- 337 - *Oligia strigilis* L. - Endemione: m 800; Crocetta; Montello, Val Padovana; Maser; m 350; M. Grappa: m 1300-1400. V-VII.
- 338 - *Oligia latruncula* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Crocetta; Endemione: m 600; Maser: m 350; M. Grappa: m 1300. V-VII.
- 339 - *Miana furuncula* Schiff. - Crocetta; Cesen, Golo: m 1250; Miuzzi. VII-IX.
- 340 - *Mesapamea secalis* L. - Endemione: m 600; Schievenin; Cesen, Milies: m 1000; Balcon: m 1000; Crocetta; M. Grappa: m 1300; Maser (alcuni esemplari di altitudine appartengono alla f. *struvei* Rag.). V-VIII.
- 341 - *Photedes captiuncula* Tr. - M. Grappa: m 1600. VII.
Specie nota, in Italia, solo delle regioni alpine centro-occidentali.
- 342 - *Photedes pygmina* Haw. - Cesen: m 750. IX.
- 343 - *Luperina testacea* Schiff. - Crocetta. IX.
- 344 - *Amphipoea oculea nictitans* Bkh. - Cesen, Balcon: m 1000; Colline di Maser. VII-IX.
- 345 - *Gortyna flavago* Schiff. - Crocetta. X.
- 346 - *Gortyna puengeleri* Trti. (1) - Endemione. X.

(1) Merita segnalazione la cattura ad Ansedonia (Toscana) della *Archanara spargani* Esp., citata dai Mariani (1941-43) solo per il Piemonte e la Lombardia.

- Per la distribuzione di questa rarissima specie nell'Italia settentrionale si rimanda alla trattazione di Wolfsberger 1969 e 1974.
- 347 - *Meristis trigrammica* Hufn. - Endemione; Crocetta; Montello, Val Padovana; Maser: m 350; Cesen: m 600. V-VI.
- 348 - *Hoplodrina alsines* Brahm. - Crocetta; Schievenin; M. Grappa: m 1500-1700; Endemione: m 1000; Cesen, Balcon: m 1000. V-VII.
- 349 - *Hoplodrina blanda* Schiff. - Colline di Maser; Cesen. VII-VIII.
- 350 - *Hoplodrina ambigua* Schiff. - Crocetta; Endemione: m 600; Cesen: m 750; Maser: m 350. V-VI, VIII-IX, XI.
- 351 - *Hoplodrina respersa* Schiff. - Cesen, Golo: m 1250; Endemione; M. Grappa: m 500-1680. VI-VII.
- 352 - *Atypha pulmonaris* Esp. - Endemione; Colline di Maser; Crocetta; Cesen, Cimon: m 1200; Montello, Val Padovana. VI-VII.
- 353 - *Spodoptera exigua* Hb. - M. Grappa: m 700; Cesen: m 750; Crocetta. VI-X.
- 354 - *Caradrina morpheus* Hufn. - Crocetta; M. Grappa: m 1700; Montello, Val Padovana; Maser. V-VIII.
- 355 - *Platyperigea kadeni* Frr. - Crocetta. IX.
- 356 - *Paradrina clavipalpis* Scop. - Crocetta; Endemione: m 700; Cesen, Milies: m 700-1000; Balcon: m 1000; Col Vernada: m 1100; Colline di Maser. V-XI.
- 357 - *Eremodrina gilva* Donz. - M. Grappa: m 1000; Cesen, Milies: m 1100, Golo: m 1250. VI-VII.
Specie nota in Italia da varie località alpine dal Piemonte fino al M. Baldo.
- 358 - *Athetis gluteosa* Tr. - Crocetta. V, IX.
- 359 - *Acosmetia caliginosa* Hb. - Crocetta; Colline di Maser. VI-VII.
- 360 - *Cucullia lucifuga* Schiff. - Endemione; M. Grappa: m 1000-1680. V-VII.
- 361 - *Cucullia lactucae* Schiff. - Crocetta. V.
- 362 - *Cucullia umbratica* L. - Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 700; Endemione: m 600; Schievenin; Asolo; Colline di Maser. VI-IX.
- 363 - *Cucullia campanulae* Frr. - M. Grappa: m 1700. VII.
- 364 - *Cucullia gnaphalii* Hb. - Endemione: m 600-1000; Cesen: m 600-900; M. Grappa: m 700. V, VIII.
- 365 - *Cucullia scrophulariae* Schiff. - Crocetta; M. Grappa. IV-V.
- 366 - *Cucullia thapsiphaga* Tr. - Endemione; Cesen, Balcon: m 1000. VII-VIII.
- 367 - *Cucullia blattariae* Esp. - Endemione; M. Grappa; Cesen. V.
- 368 - *Calophasia lunula* Hufn. - Crocetta; Colline di Maser. V, VII-IX.
- 369 - *Calophasia platyptera* Esp. - Crocetta. VI, VIII.
- 370 - *Callierges ramosa* Esp. - Cesen, Golo: m 1250. VII.
- 371 - *Episema glaucina* Esp. - Crocetta, Cesen: m 700 (con la f. *teriolensis* Htg.). IX-X.

- 372 - *Cleoceris viminalis* F. - M. Grappa; Endemione; Cesen, Golo: m 1200. VII-VIII.
- 373 - *Aporophila lutulenta* Schiff. - Cesen, Milies: m 700; Endemione: m 700; Colline di Maser. X.
- 374 - *Aporophila nigra* Haw. - Crocetta; Endemione: m 600; Colline di Maser. X-XI.
- 375 - *Lithophane socia* Hufn. - Endemione; Cesen: m 600; Milies: m 1000; Maser. IV-V, IX.
- 376 - *Lithophane ornitopus* Hufn. - Cesen: m 600. III-IV.
- 377 - *Allophyes oxyacanthae* L. - Endemione: m 800; Cesen, Milies: m 700; Miuzzi: m 1200; Maser; Crocetta. X.
- 378 - *Synvaleria oleagina* Schiff. - Cesen: m 600-650. III.
- 379 - *Dryobotodes protea* Schiff. - Colline di Maser. IX-X.
- 380 - *Blepharita satura* Schiff. - Crocetta; Cesen: m 600-750; Maser: m 300. IX.
- 381 - *Blepharita adusta* Esp. - M. Grappa: m 1300-1700; Schievenin; Endemione: m 1000; Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1250; Combai: m 350; Maser. V-VIII.
- 382 - *Blepharita solieri* B. - Crocetta; Maser: m 300. IX-X.
- 383 - *Polymixis rufocincta* Hb. - Schievenin; Endemione. X-XI.
- 384 - *Polymixis xanthomista* Hb. - Endemione. IX.
- 385 - *Antitype chi* L. - Schievenin. IX.
- 386 - *Ammoconia caecimacula* Schiff. - Maser: m 300; Crocetta; Cesen: m 600-750; Milies: m 700; Endemione. IX-X.
- 387 - *Ammoconia senex* Hb. - Cesen: m 600; Colline di Maser: m 300. IX.
- 388 - *Trigonophora flammea* Esp. - Valdobbiadene; Cesen: m 600-750; Maser: m 300. IX-X.
- 389 - *Eupsilia transversa* Hufn. - Crocetta; Cesen: m. 650; Endemione: m 1000; Colline di Maser. X, XII; II-III.
- 390 - *Xanthia croceago* Schiff. - Endemione; Colline di Maser; Cesen: m. 600. III-IV.
- 391 - *Conistra vaccinii* L. - Cesen: m 650; Endemione: m 700; Colline di Maser; Miuzzi. X-XI, II-IV.
- 392 - *Conistra rubiginosa* Scop. - Maser; Cesen: m 700; M. Grappa: m 620-800. XI-XII, III.
- 393 - *Conistra fragariae* Esp. - Cesen: m 650. XI.
- 394 - *Dasyampa erythrocephala* Schiff. - Colline di Maser. III, V.
- 395 - *Dasyampa rubiginea* Schiff. - Endemione; Asolo; Cesen: m 650. III-V. Colline di Maser. IV (f. *graslini* Stgr.)
- 396 - *Agrochola circellaris* Hufn. - Endemione: m 700; Cesen: m 750-800; Colline di Maser. IX-XI.
- 397 - *Agrochola macilenta* Hb. - Endemione: m 700; Cesen: m 600-800; Cesen, Milies: m 700. X-XI.
- 398 - *Agrochola nitida* Schiff. - Crocetta. IX-X.

- 399 - *Agrochola helvola* L. - Cesen: m 650-750; Endemione: m 700; Colline di Maser. IX-XI.
- 400 - *Agrochola litura* L. - Endemione: m 800; Schievenin; Cesen, Milies: m 700. X.
- 401 - *Agrochola lychnidis* Schiff. - Crocetta; Cesen: m 650; Endemione: m 500-700; Maser; Asolo. X-XII.
- 402 - *Agrochola lota* Cl. - Crocetta; Endemione: m 800. X.
- 403 - *Spudea ruticilla* Esp. - Colline di Maser. III.
- 404 - *Cirrhia aurago* Schiff. - Endemione: m 800. X. Cesen, Milies: m 1000. IX (ab. *fucata* Esp.).
- 405 - *Cirrhia togata* Esp. - Cesen, Milies: m 1000; Cesen: m 750. IX.
- 406 - *Cirrhia icteritia* Hufn. - Cesen: m 750; Cesen, Milies: m 700; Miuzzi. IX-X.
- 407 - *Cirrhia gilvago* Schiff. - Crocetta, X-XI.
- 408 - *Cirrhia ocellaris* Bkh. - Miuzzi: m 200. X.
- 409 - *Chloridea viriplaca* Hufn. - Crocetta. VI.
- 410 - *Chloridea peltigera* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000. VII.
- 411 - *Chloridea armigera* Hb. - Cesen: m 600-750. IX.
- 412 - *Pyrrhia umbra* Hufn. - Crocetta; Schievenin; Montello, Val Padovana; Endemione; Cesen: m 600; M. Grappa: m 800; Casacorba. V-VIII.
- 413 - *Panemeria tenebrata* Scop. - Endemione: m 1100; Cesen, Col Vrenada: m 1100; Praderadego (Mel): m 900. V.
- 414 - *Axyليا putris* L. - Crocetta; Asolo; Cesen: m 600. IV-V, VII-VIII.
- 415 - *Euthales algae* F. - Crocetta; Endemione: m 600. VI, VIII.
- 416 - *Bryoleuca raptricula* Schiff. - Crocetta; coll. Maser VI-VIII.
- 417 - *Bryophila muralis* Forst. - Colline di Maser. VIII.
- 418 - *Colocasia coryli* L. - Schievenin; Crocetta; Endemione; Asolo; Cesen: m 600; Balcon: m 1000. III-IV, VI-VIII.
- 419 - *Diloba caeruleocephala* L. - Endemione: m 700-800; Cesen: m 750; Maser. X-XI.
- 420 - *Subaeronicta megacephala* Schiff. - Endemione: m 800-1000; Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000; Col Vernada: m 1100; Maser: m 350. V, VIII, X.
- 421 - *Aeronicta aceris* L. - Schievenin; Crocetta; Endemione; Maser; M. Grappa: m 1000; Miuzzi; Cesen. V-VII.
- 422 - *Aeronicta leporina* L. - Crocetta; Schievenin; Endemione: m 600; Cesen: m 750. VI-IX.
- 423 - *Apatele alni* L. - Endemione: m 600-700; Crocetta; Schievenin; Cesen: m 600; Col Vernada: m 1100. IV-V, VII.
- 424 - *Apatele cuspis* Hb. - Crocetta. V-VIII.
- 425 - *Apatele tridens* Schiff. - M. Grappa: m 700; Maser; Crocetta; Endemione, Asolo; Cesen, Balcon: m 1000. IV-IX.
- 426 - *Apatele psi* L. - M. Grappa: m 700-1500; Endemione: m 600-1000; Cesen, Balcon: m 1000; Colline di Maser: m 350; Schievenin; Crocetta; Asolo. IV-VIII.

- 427 - *Pharetra auricoma* Schiff. - M. Grappa: m 1300-1600. VII.
428 - *Pharetra euphorbiae* L. - Schievenin; Endemione; Cesen; M. Grappa: m 1300. IV-VII, IX-X.
429 - *Pharetra rumicis* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Crocetta; Schievenin; Endemione: m 600; Asolo; Maser: m 350. III-IX.
430 - *Craniophora ligustri* F. - Montello, Val Padovana; Maser: m 350; Cesen: m 600; Endemione: m 1000; Schievenin. IV-VIII.
431 - *Metachrostis dardouini* B. - Colline di Maser. VIII.
432 - *Phyllophila obliterated* Rbr. - Colline di Maser. VII.
433 - *Jaspidia deceptoria* Scop. - Cesen, Balcon: m 1000; Crocetta; Colline di Maser: m 350; M. Grappa: m 900. V-VII.
434 - *Jaspidia pygarga* Hufn. - Crocetta; Montello, Val Padovana; Cesen; Schievenin; Vas: m 200; Colline di Maser. V-VII.
435 - *Eustrotia candidula* Schiff. - Crocetta; Endemione; Colline di Maser; Marziai. VI-IX.
436 - *Emmelia trabealis* Scop. - Crocetta. VI-VII, IX.
437 - *Acontia lucida* Hufn. - Crocetta. IX.
438 - *Acontia luctuosa* Esp. - Schievenin; M. Grappa: m 700; Colline di Maser. VII-VIII.
439 - *Nycteola revayana* Scop. - Colline di Maser. IX.
440 - *Nycteola asiatica* Krul. - Endemione: m 700; Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000. IX-X.
441 - *Earias chlorana* L. - Crocetta; Colline di Maser; Miuzzi. IV-IX.
442 - *Bena prasinana* L. - Crocetta; Cesen: m 900; Endemione; Schievenin. V-VIII.
443 - *Pseudoips bicolorana* Fuessl. - Schievenin. VII.
444 - *Eutelia adulatrix* Hbn. - Crocetta. VII.
445 - *Syngrapha interrogationis* L. - Colline di Maser. VIII.
446 - *Chrysaspidia festucae* L. - Cesen, Cimon: m 1200. VII.
447 - *Autographa gamma* L. - Cesen: m 750; Balcon: m 1000; Crocetta; Endemione: m 700; Colline di Maser. VI-X.
448 - *Autographa jota* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1250; Cimon: m 1200; M. Grappa: m 1300. VI-VIII.
449 - *Autographa bractea* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 1700; Endemione: m 1000. VII.
450 - *Macdunnoughia confusa* Steph. - Crocetta; Colline di Maser, VI, VIII-X.
451 - *Chrysodeixis chalcytes* Esp. - Crocetta; Cesen m 600-750; Maser. IX-X.
452 - *Plusia chrysitis* L. - Crocetta; Miuzzi; Cesen: m 900. V-IX.
453 - *Plusia chryson* Esp. - Crocetta, V. IX-X.
454 - *Euchalcia variabilis* Pill. - Cesen; Cimon: m 1200; Milies: m 1100; Golo: m 1250; Balcon: m 1000; Endemione: m 1100; Golo: m 1250; Balcon: m 1000; Endemione: m 600-1000; Crocetta. VI-VII.
455 - *Abrostola triplasia* L. - M. Grappa: m 1300-1600. VI-VII.
456 - *Abrostola trigemina* Wernbg. - Crocetta; Schievenin; Endemione; Maser: m 350; Cesen. V, VII-VIII.

- 457 - *Catocala fraxini* L. - Colline di Maser; Crocetta; Nevegal; Cesen: m 750; Milies: m 1100. VIII-X.
Specie scarsamente segnalata, in particolare a quote molto basse come nel caso di Crocetta e Maser.
- 458 - *Catocala nupta* L. - Crocetta; Endemione. VII, IX-X.
- 459 - *Catocala elocata* Esp. - Colline di Maser; Crocetta. VIII-IX.
- 460 - *Catocala puerpera* Giorna - Crocetta; Marziai; Schievenin. VI-IX.
- 461 - *Catocala electa* Bkh. ⁽¹⁾ - Crocetta. VIII-IX.
- 462 - *Minucia lunaris* Schiff. - Endemione. V.
- 463 - *Dysgonia algira* L. - Crocetta; M. Grappa: m 700; Schievenin; Endemione; Colline di Maser. VI-IX.
- 464 - *Grammodes bifasciata* Petagna - Crocetta. VIII.
- 465 - *Callistege mi* Cl. - Cesen; Endemione; Praderadego (Mel): m 900. V.
- 466 - *Ectypa glyphica* L. - Crocetta; Endemione: m 1000; M. Grappa: m 1600; Maser. V-IX.
- 467 - *Scoliopteryx libatrix* L. - Schievenin; Cesen: m 600; Endemione; Crocetta. VII-XI.
- 468 - *Calpe thalictri* Bkh. - Schievenin; Endemione: m 1000; Marziai; Maser; Cesen: m 750; Casacorba; Miuzzi. VI-IX.
- 469 - *Lygephila craccae* Schiff. - Schievenin; Cesen: m 600; Marziai; Crocetta. VI-VII, IX.
- 470 - *Lygephila viciae* Hbn. - Cesen: m 600; Endemione: m 800. V.
- 471 - *Lygephila pastinum* Tr. - Cesen, Cimon: m 1200. VII.
- 472 - *Catephia alchymista* Schiff. - Colline di Maser; Cesen. V.
- 473 - *Anophia leucomelas* L. - Crocetta; Marziai; Cesen: m 750. VI-IX.
- 474 - *Parascotia fuliginaria* L. - Crocetta. IX.
- 475 - *Phytometra viridaria* Cl. - Schievenin; Cesen: m 500; Crocetta; Miuzzi; Colline di Maser; M. Grappa: m 1300. IV, V-IX.
- 476 - *Rivula sericealis* Scop. - Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000; Maser: m 350; Schievenin. V-VI, VIII-IX.
- 477 - *Laspeyria flexula* Schiff. - Cesen; Crocetta. VI-IX.
- 478 - *Colobochoyla salicalis* Schiff. - Vas: m 200. V.
- 479 - *Epizeuxis calvaria* Schiff. - Crocetta. VIII.
- 480 - *Herminia barbalis* Cl. - Vas: m 200. V.
- 481 - *Zanclognatha tarsipennalis* Tr. - Crocetta; Cesen, Milies: m 1000. VI-IX.
- 482 - *Zanclognatha lunalis* Scop. - Crocetta; Schievenin; Maser. VI-VIII.
- 483 - *Zanclognatha grisealis* Hb. ⁽²⁾ - Crocetta; Vas: m 200; Miuzzi. V-VI, VIII-IX.

⁽¹⁾ Merita segnalazione la cattura di *Clytie illunaris* Hb. specie mediterranea, nella Laguna Veneta.

⁽²⁾ Un interessante reperto è costituito dalla *Simplicia rectalis* Ev. nella Laguna Veneta. Si tratta di specie steppica orientale già nota della zona Gardesana e delle Prealpi Veronesi (Wolfsberger, 1965).

- 484 - *Paracolax glaucinalis* Schiff. - Cesen; Colline di Maser. VI-VII.
485 - *Bomolocha crassalis* F. - Marziai; Colline di Maser; Miuzzi. VI-IX.
486 - *Hypena rostralis* L. - Crocetta. X-XII.
487 - *Hypena proboscidalis* L. - Cesen, Milies: m 700-1000; Endemione; Crocetta. V, VII, IX-X.
488 - *Rhynchodontodes antiqualis* Hb. - Cesen; Schievenin. V-VII.
Specie termofila rinvenuta anche in diverse località dei Colli Euganei (M. Madonna, Arquà Petrarca). La sua distribuzione sulle Alpi meridionali italiane si limita al Garda, alla Valle dell'Adige e alle Prealpi Veronesi (Wolfsberger, 1965).
489 - *Schrankia costaestrigalis* Steph. - Colline di Maser. X.

Fam. GEOMETRIDAE

- 490 - *Alsophila aescularia* Schiff. - Cesen: m 650. III-IV.
491 - *Pseudoterpna pruinata* Hufn. - Colline di Maser. VIII.
492 - *Hipparchus papilionaria* L. - Crocetta. VI, IX.
493 - *Comibaena pustulata* Hufn. - Colline di Maser. VI.
494 - *Hemithea aestivaria* Hbn. - Crocetta; Montello, Val Padovana; Colline di Maser; Endemione; Cesen, Balcon: m 1000. VI-IX.
495 - *Chlorissa pulmentaria* Gn. - Cesen, Balcon: m 1000; Colline di Maser. VII-VIII.
496 - *Thalera fimbrialis* Scop. - Crocetta; Schievenin; Maser. VII.
497 - *Hemistola immaculata* Thnbg. - Crocetta; Schievenin; Cesen, Balcon: m 1000. VII-IX.
498 - *Iodis lactearia* L. - Crocetta; Cesen; Schievenin. V, VII.
499 - *Rhodostrophia calabra* Petagna - M. Grappa: m 500; Colline di Maser; Cesen. V-VI.
500 - *Calothyssanis amata* L. - Crocetta. V-VI, VIII-IX.
501 - *Cosymbia pendularia* Cl. - Cesen; Crocetta. V.
502 - *Cosymbia orbicularia* Hbn. - Crocetta. V-VII.
503 - *Cosymbia annulata* Schulze - Cesen: m 600; Crocetta; Colline di Maser. V, VII-IX.
504 - *Cosymbia porata* L. - Colline di Maser. VII.
505 - *Cosymbia quercimontaria* Bastelb. - Cesen, Balcon: m 1000. VIII.
506 - *Cosymbia ruficiliaria* H.S. - Colline di Maser. V.
507 - *Cosymbia punctaria* L. - Cesen: m 600; Crocetta. IV-V, VII.
508 - *Cosymbia suppunctaria* Z. - M. Grappa: m 1200; Colline di Maser. VI-VII.
509 - *Cosymbia linearia* Hb. - Praderadego (Mel): m 900. V.
510 - *Scopula rubiginata* Hufn. - Crocetta. IX.
511 - *Scopula marginepunctata* Goeze - Crocetta; Cesen. V, X.
512 - *Scopula subpunctaria* H.S. - Colline di Maser: m 300; Schievenin; Casacorba. VI-VII, IX-X.

- 513 - *Scopula caricaria* Reutti - Crocetta; Balcon: m 1000. VIII-IX.
514 - *Scopula immutata* L. ⁽¹⁾ - Cesen, Balcon: m 1000; Crocetta. VII-VIII.
515 - *Scopula nigropunctata* Hufn. - Crocetta; Colline di Maser; Miuzzi. V-VI, IX.
516 - *Scopula imitaria* Hb. - Crocetta. VIII.
517 - *Scopula ornata* Scop. - Endemione: m 800; Vas: m 200; Schievenin; M. Grappa: m 650. V, IX-X.
518 - *Glossotrophia confinaria* H.S. - M. Grappa: m 650. IX.
519 - *Emmiltis pygmaearia* Hb. - Casacorba. VI.
520 - *Sterrrha ochrata* Scop. - Schievenin; Endemione: m 600. VII.
521 - *Sterrrha moniliata* Schiff. - Schievenin; Colline di Maser. VII-VIII.
522 - *Sterrrha typicata* Gn. - Endemione: m 600. VII.
523 - *Sterrrha vulpinaria* H.S. - Crocetta. VI-VII.
524 - *Sterrrha muricata* Hufn. - Crocetta; Casacorba. VI, VIII-IX.
525 - *Sterrrha dimidiata* Hufn. ⁽²⁾ - Crocetta. VIII.
526 - *Sterrrha biselata* Hufn. - Cesen; Casacorba; Crocetta. VI-VII, IX.
527 - *Sterrrha trigeminata* Hw. - Crocetta. IX.
528 - *Sterrrha politata* Hb. - Schievenin; Colline di Maser. VII.
529 - *Sterrrha filicata* Hb. - Cesen. V.
530 - *Sterrrha humiliata* Hufn. - Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 1500. VII.
531 - *Sterrrha degeneraria* Hb. - Cesen: m. 750. X.
532 - *Sterrrha inornata* Hw. - Crocetta; Cesen. VII-IX.
533 - *Sterrrha aversata* L. - Cesen, Milies: m 1000; Crocetta; Endemione: m 600-800; Schievenin. V-IX.
534 - *Rhometra sacraria* L. - Crocetta. IX.
535 - *Ortholitha plumbaria* F. - Cesen: m 600-750; Endemione: m 500. IV-VII, IX.
536 - *Ortholitha chenopodiata* L. - Cesen, Milies: m 1000-1100. VII, IX.
537 - *Ortholitha moeniata* Scop. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1000; Endemione: m 1000; Maser. VII-VIII.
538 - *Ortholitha bipunctaria* Schiff. - Schievenin; Endemione; Crocetta; Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 1300. VI-VIII.
539 - *Mesotype virgata* Hufn. - Colline di Maser: m 350; Cesen: m 600-900. IV-VI, VIII-IX.
540 - *Minoa murinata* Scop. - Cesen: m 500; Col Vernada: m 1100. VII.
541 - *Lithostege farinata* Hbn. - Endemione; Cesen, Milies: m 800; Schievenin. V-VII.

⁽¹⁾ Da segnalare la cattura di una serie di *Scopula virgulata* Schiff. ad Ansedonia (Toscana), specie finora nota, in Italia, solo delle regioni settentrionali.

⁽²⁾ La specie mediterraneo occidentale *Scopula infirmaria* Rbr. è stata catturata sul litorale tescano a Castiglione della Pescaia. Essa era nota in Italia solo di Liguria, Sardegna e Sicilia.

- 542 - *Anaitis praeformata* Hbn. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1200; Cimon: m 1200; Golo: m 1250; Endemione: m 1000; M. Grappa: m 1000-1680. VII.
- 543 - *Anaitis plagiata* L. - M. Grappa: m 500; Cesen: m 700-750; Crocetta. VI, IX-X.
- 544 - *Acasis viretata* Hb. - Cesen: m 600; Milies: m 1100; Endemione: m 600; Colline di Maser. V-VII.
- 545 - *Nothopteryx carpinata* Bkh. - Endemione. IV.
Specie segnalata in Italia solo del Piemonte, zona Gardesana e M. Baldo, Alto Adige. Il Conte Ancilotto ne ha raccolto un esemplare anche a Cortina d'Ampezzo.
- 546 - *Lobophora halterata* Hufn. - Colline di Maser; Vas: m 200; Crocetta; Cesen: m 600; Col Vernada: m 1100. IV-V.
- 547 - *Operophtera brumata* L. - Cesen: m 350-750; M. Grappa: m 800; Crocetta. XI, I.
- 548 - *Oporinia dilutata* Schiff. - Endemione: m 800; Cesen: m 750. X-XI.
- 549 - *Oporinia autumnata* Bkh. - Cesen. Milies: m 700.
- 550 - *Triphosa sabaudiata* Dup. - Cesen: m 600. IV.
- 551 - *Triphosa dubitata* L. - Cesen; Cimon: m 1200; Endemione: m 1000; M Grappa: m 1700; Crocetta. V-VII.
- 552 - *Calocalpe undulata* L. - Cesen; Cimon: m 1200; Golo: m 1250. VII.
- 553 - *Philereme vetulata* Schiff. - Colline di Maser. VI.
- 554 - *Philereme transversata* Hufn. - Schievenin. VII.
- 555 - *Eustroma reticulata* Schiff. - Cesen, Golo: m 1200. VIII.
La specie risulta segnalata in Italia solo della Venezia Tridentina.
- 556 - *Lygris pyraliata* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Schievenin. VII.
- 557 - *Cidaria (Cidaria) fulvata* Forst. - Cesen; Cimon: m 1200; M. Grappa. VII.
- 558 - *Cidaria (Thera) variata* Schiff. - Cesen: m 750; Crocetta. V, VII-XI.
- 559 - *Cidaria (Thera) cognata* Thnbg. - M. Grappa: m 1400-1680. VII.
- 560 - *Cidaria (Thera) juniperata* L. - Endemione: m. 800; Cesen: m 350; Crocetta; Maser. X-XI.
- 561 - *Cidaria (Thera) firmata* Hb. - Colline di Maser: m 300; Endemione: m 800; Cesen: m 750-1000. VII, X.
- 562 - *Cidaria (Chloroclysta) siterata* Hufn. - Cesen, Balcon: m 1000; Maser m 300; Crocetta; Endemione; M. Grappa: m 650-1000. VI-VII, IX-X.
- 563 - *Cidaria (Dysstroma) truncata* Hufn. - Cesen, Balcon: m 1000; Crocetta. VII-VIII.
- 564 - *Cidaria (Dysstroma) citrata* L. - Cesen, Milies: m 700-1000; Marziai. VIII-X.
- 565 - *Cidaria (Xanthorhoë) fluctuata* L. - Crocetta; Cesen; M. Grappa: m 1800. IV, VI, IX.
- 566 - *Cidaria (Xanthorhoë) montanata* Schiff. - M. Grappa: m. 1300-1800; Cesen, Golo: m 1250. VI-VII.

- 567 - *Cidaria* (*Xanthorhoë*) *spadicearia* Schiff. - Cesen, Milies: m 1000; Col Vernada: m 1100; Golo: m 1200; M. Grappa: m. 1300. V-IX.
- 568 - *Cidaria* (*Xanthorhoë*) *ferrugata* L. - Crocetta; Cesen: m 600; Schievenin; Casacorba; M. Grappa: m 1680; Miuzzi. V-IX.
- 569 - *Cidaria* (*Xanthorhoë*) *designata* Hufn. - M. Grappa: m 1800. VI.
- 570 - *Cidaria* (*Nycterosea*) *obstipata* F. - Crocetta. VIII, X.
- 571 - *Cidaria* (*Colostygia*) *olivata* Schiff. - M. Grappa: m 650; Maser; Miuzzi. IX-X.
- 572 - *Cidaria* (*Colostygia*) *pectinataria* Knoch - Vas: m 200; Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1200; Crocetta; Endemione; Maser: m 350. V-VIII.
- 573 - *Cidaria* (*Colostygia*) *ablutaria* Bsd. - Cesen: m 600-1000; M. Grappa: m 650-1800; Col Vernada: m 1100. III-VII, IX.
- 574 - *Cidaria* (*Colostygia*) *parallelolineata* Retz. - Maser: m 300. X.
- 575 - *Cidaria* (*Lampropteryx*) *ocellata* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1000; Vas: m 200; M. Grappa: m 1300. V-IX.
- 576 - *Cidaria* (*Lampropteryx*) *suffumata* Schiff. - Cesen, Col Vernada: m 1100. V.
- 577 - *Cidaria* (*Entephria*) *caesiata* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000. VII.
- 578 - *Cidaria* (*Entephria*) *cyanata* Hbn. - M. Grappa: m 1680. VII.
- 579 - *Cidaria* (*Entephria*) *nobiliaria* H.S. - M. Grappa: m 1800. VI.
- 580 - *Cidaria* (*Coenotephria*) *verberata* Scop. - M. Grappa: m 1680. VII.
- 581 - *Cidaria* (*Coenotephria*) *obsoletaria* H.S. - Cesen, Milies: m 1000. VIII-IX.
- 582 - *Cidaria* (*Coenotephria*) *berberata* Schiff. Endemione: m 600; Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1200; Golo: m 1250; Maser; M. Grappa: m 1800; Miuzzi.
- 583 - *Cidaria* (*Coenotephria*) *derivata* Schiff. - Endemione; Cesen: m 900. IV-V.
- 584 - *Cidaria* (*Coenotephria*) *sagittata* F. - Cesen, Milies: m 1100; Golo: m 1250. VI-VII.
- 585 - *Cidaria* (*Euphyia*) *frustata* Tr. - M. Grappa: m 1600-1680. VII.
- 586 - *Cidaria* (*Euphyia*) *cuculata* Hufn. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1200; Golo: m 1250; Crocetta; Colline di Maser. V-IX.
- 587 - *Cidaria* (*Euphyia*) *luctuata* Schiff. - M. Grappa: m 1800. VII.
Specie nota solamente della Venezia Tridentina (Mariani, 1941-43).
Nella collezione è presente anche di Cortina d'Ampezzo.
- 588 - *Cidaria* (*Euphyia*) *molluginata* Hbn. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1200; M. Grappa: m 1680-1800, VI-VII.
- 589 - *Cidaria* (*Euphyia*) *bilineata* L. - Schievenin; Endemione; Crocetta. V, VII-X.
- 590 - *Cidaria* (*Ecliptopera*) *capitata* H.S. - Cesen. V.
- 591 - *Cidaria* (*Ecliptopera*) *silaceata* Schiff. - Crocetta. V.
- 592 - *Cidaria* (*Electrophaës*) *corylata* Thnbg. - Cesen, Col Vernada: m 1100. V.
- 593 - *Cidaria* (*Mesoleuca*) *albicillata* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1250. VII.

- 594 - *Cidaria (Melanthia) procellata* Schiff. - Colline di Maser; Crocetta; Cesen; Endemione: m 600; Montello, Val Padovana; Vas: m 200; M. Grappa: m 650. V-VII, IX.
- 595 - *Cidaria (Epirrhoë) tristata* L. - Cesen, Milies: m 1000; Golo: m 1250; Crocetta; Cansiglio. VI-VII, IX.
- 596 - *Cidaria (Epirrhoë) hastulata* Hbn. - Endemione: m 600; Cesen, Milies: m 1100; Golo: m 1250. VII-VIII.
- 597 - *Cidaria (Epirrhoë) galiata* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Col Vernada: m 1100; Crocetta; M. Grappa: m 1680. V-VI, IX.
- 598 - *Cidaria (Epirrhoë) alternata* Müll. - Cesen: m 600-700; Balcon: m 1000; Col Vernada: m 1100; Crocetta; Schievenin; Miuzzi. V-VII, IX-X.
- 599 - *Cidaria (Perizoma) alchemillata* L. - Crocetta; Cesen. VII.
- 600 - *Cidaria (Perizoma) hydrata* Tr. - Cesen; Schievenin; Vas: m 200. V.
- 601 - *Cidaria (Perizoma) minorata* Tr. - Cesen: m 700; Milies: m 1000-1100;
- 602 - *Cidaria (Perizoma) blandiata* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1000. VII-IX.
- 603 - *Cidaria (Perizoma) albulata* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Col Vernada: m 1100; Golo: m 1250; M. Grappa: m 1300-1500; Maser: m 350. V-VII.
- 604 - *Cidaria (Perizoma) flavofasciata* Thnbg. - Crocetta; Endemione. VI-VIII.
- 605 - *Cidaria (Hydriomena) furcata* Thnbg. - Cesen, Milies: m 1000-1100; Cimon: m 1200; Golo: m 1200; Balcon: m 1000; M. Grappa: m 1300. VI-IX.
- 606 - *Cidaria (Hydriomena) ruberata* Frr. - Cesen: m 900; M. Grappa: m 1300. V-VI.
- 607 - *Cidaria (Earophila) badiata* Schiff. - Endemione; Cesen: m 600. IV.
- 608 - *Cataclysmes riguata* Hbn. - Cesen: m 600-900; Col Vernada: m 1100; Endemione; Schievenin; Maser: m 350. IV-VII.
- 609 - *Venusia cambrica* Curt. - Cesen, Cimon: m 1200; Golo: m 1250. VII.
- 610 - *Hydrelia testaceata* Don. - Cesen, Milies: m 1200. VI.
- 611 - *Hydrelia flammeolaria* Hufn. - Cesen. VII.
- 612 - *Asthena albulata* Hufn. - Cesen, Milies: m 1000. V, IX.
- 613 - *Asthena anseraria* H. S. - Vas: m 200; Colline di Maser; M. Grappa: m 1300. V-VI, VIII.
- 614 - *Eupithecia plumbeolata* Haw. - Colline di Maser: m 350; Crocetta; Cesen. V-VII.
- 615 - *Eupithecia pini* Retz. - Cesen, Milies: m 1000; Golo: m 1250; M. Grappa: m 1680. VI-VII.
- 616 - *Eupithecia centaureata* Schiff. - Cesen: m 600; Balcon: m 1000; Crocetta; Colline di Maser. V-VIII.
- 617 - *Eupithecia gratiosata* H.S. - Maser; Cesen, Balcon: m 1000; Golo: m 1250; Schievenin. VII.

Come ha già messo in luce Wolfsberger, 1971, questa specie tipicamente

- mente mediterranea e localizzata sul margine meridionale delle Alpi, può innalzarsi ad una certa altitudine come nelle suddette località.
- 618 - *Eupithecia breviculata* Donz. - Schievenin; Crocetta. VI-VII.
619 - *Eupithecia selinata* H.S. - Crocetta; Vas: m 200. V-VI.
620 - *Eupithecia trisignaria* H.S. - Crocetta. V.
621 - *Eupithecia veratraria* H.S. - Maser. VIII.
622 - *Eupithecia cretacea* Pack. ssp. *fenestrata* Mill. - M. Grappa: m 1680-1800. VI-VII.
623 - *Eupithecia satyrata* Hbn. - Cesen: m 900; Col Vernada: m 1100. V.
624 - *Eupithecia tripunctaria* H.S. - Crocetta; Colline di Maser. V, IX.
625 - *Eupithecia assimilata* Dbld. - Crocetta. VIII.
626 - *Eupithecia castigata* Hbn. - Cesen: m 600; Balcon: m 1000; Milies: m 1200; Golo: m 1250; Miuzzi; Crocetta; Colline di Maser. V-VII.
627 - *Eupithecia icterata* Vill. ssp. *subfulvata* Haw. - Cesen: m 600; Milies: m 1000. V, IX.
628 - *Eupithecia impurata* Hbn. - Schievenin; Colline di Maser. VI, IX.
629 - *Eupithecia subumbrata* Schiff. - Endemione; Cesen: m 900; Col Vernada: m 1100; Crocetta. V-VI.
630 - *Eupithecia gemellata* H.S. - Colline di Maser. V.
631 - *Eupithecia pimpinellata* Hbn. - Cesen, Milies: m 1000; Colline di Maser. VIII-IX.
632 - *Eupithecia innotata* Hufn. - Cesen: m 600; Milies: m 1000, IV, IX.
633 - *Eupithecia dodoneata* Gn. - Vas: m 200. V.
634 - *Eupithecia sobrinata* Hbn. - Endemione: m 800; Cesen: m 600; Balcon: m 1000; Milies: m 1000; Colline di Maser: m 300. VIII-X.
635 - *Eupithecia ericeata* Rmb. - Maser: m 300. X.
636 - *Eupithecia lariciata* Frr. - Cesen, Col Vernada: m 1100. V.
637 - *Eupithecia tantillaria* Bsd. - Schievenin; Cesen, Milies: m 1100. V-VI.
638 - *Gymnoscelis pumilata* Hbn. - Crocetta; Cesen: m 600; Colline di Maser. IV, VI-VIII, XII.
639 - *Chloroclystis coronata* Hbn. - Cesen: m 600-900; Colline di Maser; Crocetta. V-VI, VIII.
640 - *Chloroclystis rectangulata* L. - Cesen. V.
641 - *Horisme vitalbata* Schiff. - Cesen: m 600; Endemione; Schievenin; Miuzzi. V, VII, IX.
642 - *Horisme tersata* Schiff. - Cesen; Crocetta; Colline di Maser: Miuzzi. V-VI, VIII-IX.
643 - *Horisme aemulata* Hbn. - M. Grappa: m 1800. VII.
644 - *Abraxas sylvata* Sc. - Cesen, Balcon: m 1000. VII.
645 - *Lomaspilis marginata* L. - Cesen; Crocetta; Endemione; Vas: m 200; Colline di Maser. V, VII, IX.
646 - *Lygdia adustata* Schiff. - Cesen: m 600-800; Schievenin; Endemione. V, VII, IX.

- 647 - *Bapta bimaculata* F. - Cesen: m 600; Col Vernada: m 1100; Vas: m 200; Colline di Maser. V, VIII.
- 648 - *Bapta temerata* Schiff. - Colline di Maser; Cesen: m 600-800; Endemione; Miuzzi. V-VII, IX.
- 649 - *Lomographa trimaculata* Vill. - Colline di Maser; Crocetta. VI, IX.
- 650 - *Cabera pusaria* L. - Crocetta; Endemione: m 800; Cesen: m 900; Montello. V-VII.
- 651 - *Cabera exanthemata* Scop. - Crocetta; Casacorba; M. Grappa: m 1800. VI, VIII.
- 652 - *Anagoga pulveraria* L. - Vas: m 200; Cesen: m 900; Colline di Maser; Schievenin; Endemione: m 700. IV-V, VII.
- 653 - *Elloptia fasciaria* L. - Cesen: m 750; M. Grappa: m 1400. X-XI.
- 654 - *Campaea margaritata* L. - Schievenin; Crocetta; Endemione: m 800; Montello, Val Padovana; M. Grappa: m 500, Cesen, Balcon: m 1000. V-IX.
- 655 - *Ennomos quercinaria* Hufn. - Maser: m 300; Crocetta. X.
- 656 - *Deuteronomos fuscantaria* Steph. - Miuzzi: m 200. X.
- 657 - *Deuteronomos erosaria* Hbn. - Endemione; Cesen: m 750; Schievenin. IX-XI.
- 658 - *Selenia bilunaria* Esp. - Crocetta; Cesen: m 600-750; Col Vernada: m 1100; Endemione; Asolo; Colline di Maser. II-V, IX.
- 659 - *Selenia lunaria* Schiff. - Asolo; Endemione; Crocetta; Colline di Maser; Montello, Val Padovana; Cesen: m 600. IV-VI, VIII.
- 660 - *Selenia tetralunaria* Hufn. - Crocetta; Cesen, Col Vernada: m 1100. IV-V, VII.
- 661 - *Phalaena syringaria* L. - Cesen, Golo: m 1250. VII.
- 662 - *Gonodontis bidentata* Cl. - Endemione: m 800; Cesen: m 600; Col Vernada: m 1100; Vas: m 200; M. Grappa: m 1300. V-VI.
- 663 - *Colotois pennaria* L. - Endemione: m 800; Cesen: m 750. X-XI.
- 664 - *Crocallis tusciaria* Bkh. - Endemione: m 700. X.
- 665 - *Crocallis elinguaris* L. - Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 650; Colline di Maser; Miuzzi. VIII-IX.
- 666 - *Angerona prunaria* L. - Cesen, Golo: m 1250; Montello, Val Padovana; Endemione; Crocetta. V-VII, IX.
- 667 - *Ourapteryx sambucaria* L. - Schievenin; Endemione: m 800; M. Grappa: m 800; M. Grappa: m 500; Cesen, Balcon: m 1000. VI-VII.
- 668 - *Plagodis dolabraria* L. - Maser: m 350; Cesen, Balcon: m 1000; Schievenin; Endemione: m 600; Crocetta. V, VII-VIII.
- 669 - *Opisthograptis luteolata* L. - Endemione; Crocetta; Cesen: m 600; Balcon: m 1000; Montello. V-VIII.
- 670 - *Epione parallelaria* Schiff. - Cesen, Cimon: m 1200. VII.
Specie segnalata in Italia solo della Venezia Tridentina.
- 671 - *Lithina chlorosata* Scop. - Montello, Val Padovana. V.

- 672 - *Pseudopanthera macularia* L. - Praderadego (Mel): m 900; Endemione; Cesen, Col Vernada: m 1100; Lentiai; Crocetta. V-VII.
- 673 - *Semiothisa notata* L. - Cesen. V.
- 674 - *Semiothisa alternaria* Hbn. - Cesen: m 600-900; Crocetta; M. Grappa: m 1700. V-IX.
- 675 - *Semiothisa liturata* Cl. - Cesen; Maser. IV-V, VIII.
- 676 - *Semiothisa clathrata* L. - Crocetta; Maser: m 350. V, VIII-IX.
- 677 - *Semiothisa glarearia* Brahm. - Schievenin; Cesen. V, VII.
- 678 - *Semiothisa artesiaria* Schiff. - Crocetta. IX.
- 679 - *Tephрина arenacearia* Schiff. - Crocetta. VI, VIII-IX.
- 680 - *Nyssia alpina* Sulz. - M. Grappa: m 1300-1800. VI.
- 681 - *Nyssia florentina* Stef. - Crocetta. III-V.
- 682 - *Lycia hirtaria* Cl. - Crocetta; Endemione; Montello; Asolo; Cesen. III-IV.
- 683 - *Biston strataria* Hufn. - Endemione; Cesen. III-IV.
- 684 - *Biston betularia* L. - Endemione: m 600-700; Crocetta; Cesen. V-VII.
- 685 - *Hemerophila abruptaria* Thnbg. ⁽¹⁾ - Colline di Maser; Endemione: m 600; Crocetta; Schievenin; Cesen: m 600-900. IV-VII.
- 686 - *Synopsis sociaria* Hbn. - Maser; M. Grappa. VI, VIII.
- 687 - *Boarmia (Peribatodes) rhomboidaria* Schiff. - Schievenin; Cesen, Milies: m 700; Crocetta; Maser: m 300; Endemione; Marziai. V, VIII-X.
- 688 - *Boarmia (Cleora) cinctaria* Schiff. - Cesen, Col Vernada: m 1100; Endemione; Colline di Maser. V-VI.
- 689 - *Boarmia (Deileptenia) riberata* Cl. - Cesen, Milies: m 1100. VIII.
- 690 - *Boarmia (Alcis) repandata* L. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1100; Golo: m 1250; M. Grappa: m 1300-1700; Schievenin; Endemione: m 1000. VII-VIII.
- 691 - *Boarmia (Fagivorina) arenaria* Hufn. - Schievenin. VII.
- 692 - *Boarmia (Serraca) punctinalis* Scop. - Cesen: m 900; Maser: m 350; Endemione; Schievenin; Crocetta; IV-V, VII, IX.
- 693 - *Boarmia (Ascotis) selenaria* Schiff. - Crocetta; Cesen: m 650. V-VIII.
- 694 - *Boarmia (Ectropis) bistortata* Goeze - Crocetta; Endemione; Cesen, Balcon: m 1000. IV, VII-VIII.
- 695 - *Boarmia (Ectropis) extersaria* Hbn. - Montello, Val Padovana; Endemione: m 700; Cesen, Balcon: m 1000. V-VII.
- 696 - *Tephronia sepiaria* Hufn. ⁽²⁾ - Crocetta. V-VI.
- 697 - *Gnophos (Gnophos) furrata* Schiff. - Colline di Maser; M. Grappa: m 700. VIII-IX.

⁽¹⁾ È di rilevante interesse il rinvenimento di due esemplari di *Hemerophila japygiaria* Costa in Toscana ad Ansedonia.

⁽²⁾ È degna di interesse la segnalazione di una vasta serie di *Rhoptria asperaria* Hb. catturata sui Colli Euganei al M. Madonna.

- 698 - *Gnophos (Lysognophos) obscurata* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; M. Grappa: m 650; Colline di Maser. VIII-IX.
699 - *Gnophos (Costignophos) pullata* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000. VII.
700 - *Gnophos (Rhopalognophos) glaucinaria* Hbn. - M. Grappa: m 1200-1300; Crocetta; Cesen: m 700-900; Endemione. V-VI.
701 - *Gnophos (Euchrognophos) variegata* Dup. - Colline di Maser. V.
702 - *Gnophos (Catascia) dilucidaria* Schiff. - Cesen, Balcon: m 1000; Milies: m 1000; M. Grappa: m 1500-1700; Crocetta. VII-IX.
703 - *Ematurga atomaria* L. - Casacorba; Crocetta. V, VII.
704 - *Selidosema plumaria* Schiff. - Cesen: m. 700. IX.
705 - *Dyscia raunaria* Frr. - Cesen: m 600. V, IX-X.

RIASSUNTO

L'A. prende in esame i Macrolepidotteri raccolti dal C.te Alberto Ancilotto sulle Prealpi Venete, in numerose località, elencate all'inizio del lavoro, comprese tra il M. Grappa ed il gruppo del M. Cesen ad est del Piave e dalla pianura alle cime più elevate (M. Grappa m 1775, Gruppo del Cesen m 1250).

La lepidotterofauna comprende complessivamente 705 specie. Inoltre vengono anche segnalati i più interessanti reperti contenuti nella medesima collezione e provenienti, in particolare, dalla Laguna Veneta, dai Colli Euganei e dal litorale Toscano.

Nell'elenco vengono messe in evidenza le specie più rare o comunque interessanti mentre precedono alcune considerazioni generali.

The Butterflies and Moths of the Venetian Pre-Alps on the Basis of Collection A. Ancilotto

SUMMARY

The Author has examined the Macrolepidoptera collected by Count Alberto Ancilotto on the Pre-Alps of the Veneto, in numerous localities, listed at the beginning of the work, comprising the region between Mount Grappa and the Mount Cesen group to the east of the Piave, and from the plain to the highest peaks (Mount Grappa, 1.775 metres, the Cesen Group, 1.250 metres).

The lepidoptera fauna include in all 705 species. In addition, the attentions is drawn to the most interesting discoveries contained in the same collection, and coming, in particular from the Venetian Lagoon, from the Euganean Hills and from the Tuscan litoral.

The rarest or although interesting species are brought into evidence and first comes certain general considerations.

BIBLIOGRAFIA

- ANCILOTTO A., GROLO A., ZANGHERI S., 1970. - Nel mondo delle farfalle. I bruchi. - Mondadori Milano.
CIAMPOLINI M., 1956. - Note biologiche sulla *Brithys pancratii* Cyr. (Lepidoptera, Noctuidae) infeudata in Italia a piante del gen. *Pancreatium* L. - Redia, 41: 511-524.

- FORSTER W. und WOHLFART T. A., 1960-71. — Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Bd. II-III — Franckh'sche Verlagsbuchhandlung Stuttgart.
- HIGGINS L. G. & RILEY N. D., 1971. — Guide des papillons d'Europe (Rhopalocères) - Delachaux et Niestlé Neuchâtel.
- KUSDAS K. e THURNER J., 1955. — Beitrag zur Insektenfauna der Provinz Udine (Oberitalien). - *Atti I Conv. Friulano Sc. Nat.*, pp. 273-334, Udine.
- MARIANI M., 1941-43. — Fauna Lepidopterorum Italica. Pt. I. Catalogo ragionato dei Lepidotteri d'Italia. - *Giorn Sc. Nat. Econ. Palermo*, 24: pp. 1-236.
- SCHMIDLIN A., 1964. — Übersicht über die europäischen Arten der Familie Geometridae (Lep.) — *Mitt. Entom. Gesell. Basel*, N. F. 14, 77-137.
- WOLFSBERGER J., 1961 a. — Eine neue Unterart von *Ptilophora plumigera* Esp. aus den Lessinischen Voralpen in Oberitalien (Lep.). - *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 65-66.
- , 1961 b. — Die von Graf. G. B. Cartolari in der Umgebung von Canello in den Lessinischen Voralpen gesammelten Macrolepidopteren. - *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 9: 187-266.
- , 1965. — Die Macrolepidopteren - Fauna des Gardaseegebietes. - *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 13: 1-386.
- , 1969. — Die Verbreitung von *Gortyna puengeleri* Trt. (Lep. Noct.). - *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 17: 241-246.
- , 1970. — *Meliana stenoptera* Stgr., eine für Europa neue Noctuidae (Lepidoptera). - *Boll. Soc. Ent. Ital.*, 102: 91-94.
- , 1971. — Die Macrolepidopteren-Fauna des Monte Baldo in Oberitalien. - *Mus. Civ. St. Nat. Verona - Mem. fuori serie* n. 4, pp. 1-335+20 tav.
- , 1974. — Die Macrolepidopteren-Fauna des Gardaseegebietes (1. Nachtrag). - *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Verona*, 1: 167-193.
- ZANGHERI S., 1958 a. — Osservazioni su alcune importanti specie di Lepidotteri della Laguna di Venezia. - *Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia*, 11: 19-27.
- , 1958 b. — Infestazione di « *Cerapteryx graminis* L. » (Lepidoptera Noctuidae Hadeninae) sui pascoli del M. Cesen (Valdobbiadene - Treviso). - *Boll. Ist. Entom. Univ. Bologna*, 23: 191-203.
- , 1960. — Ricerche faunistiche e zoogeografiche sui Lepidotteri delle Puglie e della Lucania. - *Mem. Soc. Entom. It.*, 39: 5-35.